

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ МЕСЯЧНІК СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

Зьмест.

Што такое спецыяльная гаспадарка	1 ст.
Мінеральныя ўгнаенні	2 "
Азотныя гнаі	3 "
Попел, як угнаенне	5 "
Рожа ў сьвіней	6 "
Лячэнне наравістага каня	7 "
Як уберагчы гусенят ад здыхаты	7 "
Як прыгатаваць дамовым спосабам тварог	8 "
Як зрабіць добры сыр	10 "
Як залажыць школку і гадаваць прышчэпы	10 "
Травень на пчольніку	12 "
Як высушыць сырое памяшчэнне	13 "
Доследы з пасевамі бульбы на балоце	13 "
Дасьлед з попелам	15 "
Парады Агранома	16 "
Паптовая скрынка	17 "

ЦАНА асобнага нумару з дастаўкай да хаты 30 гр.,

Што такое спецыяльная гаспадарка.

Хто з Вас, Браты-Беларусы, быў у латышоў каля Рыгі, той, пэўна, бачыў на чыстых паскох, на якіх у нас ня можа расьці ніякая наша збажына,—буйныя ягаднікі суніц (паземак, землянікі), за ягады якіх латыскі селянін выручае каля 1.000 р. у год. І гэта з пяшчанага бязплоднага гародчыка вялічынёй ў паўдзсяціну.

Што прывяло латыша да таго, што ён пакінуў той спосаб вядзеньня сельскае - гаспадаркі, які практыкуецца яшчэ ў нас на Беларусі і перайшоў да вузкай спецыяльнасьці? Час, жыцьцё, а перадусім малазямелье.

Даўнейшы гаспадар стараўся, каб са сваёй гаспадаркі мець даволі жыта на хлеб, ячменю на крупы, аўса на бліны, капусты, буракоў, бульбы, каб мець малака, адзежу і ўсё, што трэба для яго жыцця.

Цяпер такі тып гаспадаркі ўдзержацца ня можа, бо калі-б гаспадар пачаў старацца сам здаволіць усе патрэбы, не прыкупляючы нічога збоку, а таксама нічога не прадаючы, ён мусіў-бы хутка кінуць сваю гаспадарку і ўцякаць кудысьці, хаця-б ад адных эквэстрараў.

Сучасны тып гаспадаркі іншы ўжо тым, што на зямлю павінны мы глядзець толькі, як на варштат, або фабрыку для вырабу тавару, каторы можна было-б як найдаражэй прадаць. Цяпер гаспадар не павінен зьвяртаць увагі на тое, каб было ўсё сваё, а на тое, каб на ўсё было, на ўсё хапало.

І вось у Амэрыцы і Зах. Эўропе мы ўжо бачым такія тыпы гаспадарак:

Гаспадаркі спецыяльныя. Спецыяльная гаспадарка прыпасована да таго, каб вытварыць, як магчыма болей, аднароднага тавару найлепшай якасьці, а тады за грошы ад прадажы тавару, здаволіць усе свае патрэбы. Там спецыялізацыя гаспадаркі пашла далёка, што ёсьць фермы (хутары), каторыя гадуюць, напрыклад, адных толькі курэй, іншыя — ўсю сваю зямлю засадзілі садам і то адным гатункам дрэў. Гэтакая спецыялізацыя мае той добры бок, што гаспадар, вытвараючы адзін які-небудзь прадукт—тавар, можа добра ведаць, як гадаваць, або вытвараць як найболей і найлепшага, а тым самым і найдаражэйшага тавару; тады, як наш гаспадар, вядучы рознобаковую гаспадарку, каб усё ведаць, павінен быў-бы знаць амаль ня ўсё, якія ёсьць на сьвеце навукі. А гаспадар пры спецыяльнай гаспадарцы можа мець з яе ў дзсяць, а то і ў дваццаць раз большы даход.

Гэты тып гаспадаркі пачынае шырыцца і ў нас на Беларусі па дварох і засьценках дзе гаспадаруюць балей

140527

Digitized by Google
Mokelq Akademijs

руплівыя і разумныя гаспадары, але бяда толькі ў тым, што наша вёска ўхіляецца ад гэтага, а між тым спецыяльная гаспадарка якраз найболей дае карысці пры дробных надзелах, дзе даглядаюць за ўсім свае рабочыя рукі.

Ведама, што ўсякая спецыяльнасць вымагае спецыяльнай навуковай падгатоўкі і нельга раіць усім і зараз - жа пераходзіць да спецыяльнай гаспадаркі, бо апошняя вымагае ад гаспадара падгатоўкі і звання. Але трэба думаць, што жыццё і час, які „не за гарамі“ прымусіць перайсці да гэтага і нас беларусаў. Спачатку прымусца за спецыяльную гаспадарку людзі сільнейшыя навукай, энэргіей, срытам. Гэты руплівы элемент і сеньня патрохі пачынае мяркавацца з умовамі, пры якіх знаходзіцца яго гаспадарка, які гавар цяпер „ухаду“ і паступова пераходзіць да спецыялізацыі. Да гэтага прымушае нас пераходзіць яшчэ і тыя абставіны, што старая гаспадарка, як яе яшчэ завуць натуральнай, вымагае большага абшару зямлі. Новая-ж гаспадарка, або спецыяльная магчыма і на дробным надзелу, абы толькі гаспадар меў поўную сьведомасць у сваёй спецыяльнасці і быў пакупецку руплівым. Гаспадар новай сучаснай гаспадаркі мусіць, як кажучь, стаяць адзін нагой на сваёй ніве, а другой — на рынку ў горадзе ці мястэчку.

У. Павальковіч.

Мінэральныя угнаенні.

Каб мець з зямлі ўраджай, акупаючы цяжкую працу гаспадара, ён павінен даць зямлі патрэбную для ўзросту раслін колькасць спажываных матэрыялоў, ад прысутнасці якіх залежыць рост раслін.

У кожным грунце бывае ў той ці іншай колькасці гэтыя спажываныя складнікі, але на нашых землях яны амаль не заўсёгды знаходзяцца ў такім стане, з якога расліны карыстацца ня могуць. Праўда, правільная апрацоўка зямлі, правільнае чарадаванне раслін у полі, сілы прыроды—памагаюць перавадзіць пажываную матэрыю зямлі з аднаго стану ў другі, але пераход гэты робіцца вельмі марудна, дзеля чаго гаспадар мусіць папаўняць недахоп спажывы для раслін праз унясенне ўгнаення.

Як мы бачылі ў папярэднім нумары „Сахі“ (глядзі „Як павялічыць уражайнасць зямлі“),—на нашых грунтах найчасцей не хапае азоту, фосфару і паташу. Усе гэтыя тры складнікі гаспадар разам уносіць у зямлю, угнаваючы яе хлеўным гноем. Гэты гной, апроч таго, што ўзбагачае зямлю ўсімі патрэбнымі для раслін матэрыямі, аказвае яшчэ

і ўкоснае дзеянне, заражая зямлю карыснымі бактэрыямі, абагачае яе гумасом, ад чаго палепшаецца структура (будова) ралы і г. д. Усё гэта кажа, што гной ад скаціны трэба лічыць найлепшым. Але, нажаль, у нас, пры мала-развітай жывёлагадоўле, гэтага гною кожны раз не хапае. Каб добра ўгнаць зямлю, трэба, як гэта паказалі практыка і навуковыя даследы, палажыць на горшых, бяднейшых грунтах каля 3600 пудоў на дзесяціну, ці 1¹/₂ пуд. на кв. саж., а на лепшых — 2400 пуд. на дзес., ці 1 пуд на кв. саж. Лічучы па 20 пуд. гною на воз, у першым выпадку нам будзе патрэбна яго на дзесяціну 180 вазоў, а ў другім 120. Вядома, што наш сялянін ня ўносіць гэтага гною і паловы таго, што патрабуе наша зямля. Вось галоўная прычына нашых нізкіх уражанняў, вось таму цяжкая праца нашага земляроба рэдка дзе акупаецца.

Цяпер робіцца зразумелым, што, калі гаспадар жадае павялічыць свой ураджай, ён мусіць папоўніць недахоп гною ад скаціны другім угнаеннем, якім і будзе мінеральнае угнаенне. Але, каб часам ня кідаць грошы за вакно, мы мусім ведаць натуру гэтых угнаенняў, на якія яны ляпей надаюцца землі і пад якія збожжы. Толькі тады наш земляроб можа ўжываць іх з карысцю для гаспадаркі.

На ўсіх землях найвыразней выступаець брак азоту.

Азотныя гнаі.

Чылійская салетра. Паклады Чылійскай салетры знаходзяцца на заходнім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі (Чылі). Гэта ёсць злучэнне азотнага квасу з содам (NaNO_3), у якой чыстага азоту бывае 15—16%. Чылійская салетра — белая соль, якая дрэнна перахоўваецца, бо прыцягваючы з паветра вогкасць, хутка збіваецца ў камякі. Салетра шмат хутчэй упывае на расліны, чым іншыя азотныя гнаі. Зямля салетру не затрымлівае, ад чаго яна хутка выпаласківаецца ў ніжэйшыя слаі, адкуль караньчыкі раслінна могуць яе спажыць. Дзеля гэтага салетру сеюць па руні.

Калі жадаем ратаваць слабыя засевы, дык салетра тут робіць дзівы. Пад азіміну салетру сеюць 2 разы: у восень па руні і вясной, як толькі азіміна пачынае прабуджацца к жыццю. З ярынаў найлепш спажываюць салетру авёс. Пад бульбу салетру трэба ўнасіць загодзьдзя, бо ад яе бульба зрастаецца моцна ў каліе і апазніваецца з завязываннем бульбінаў. Болей усяго адклікаюцца на ўнясенне салетры буракі, пад якія яе ўносяць 2—3 разы; першы раз, як толькі ўзойдуць расліны, а апошні ў чэрвені перад апошняй апаўкай буракоў.

Салетра, пападаючы на воўгкія часткі раслін, нішчыць іх зусім, дзеля чаго яе сеюць у час сухой пагоды і на су-хія раслінкі.

Салетра—гэта атрута, а таму трэба ня пускаць скаціну на сьвежа-салетраванае поле.

Немцы перад вайной ужывалі салетры на дзесяціну да 25 пуд. і знаходзілі, што ўжываньне яе аплачвалася і ў такой колькасці. У нас на Беларусі, дзякуючы другім эканамічным умовам жыцця, спадзтвацца, што 25 пуд. салетры на дзесяціну аплаціцца—рызыкаўна. Ужываюць каля 10 пуд. на дзесяціну.

Нарвэская салетра—гэта злучэньне азотнага квасу з вапнай. Мае каля 13% азоту і розніцца ад чылійскай салетры тым, што ў апошняй азот зьвязаны з содай, а ў нарвэскай з вапнай, дзеля чаго ўжываньне яе карысна адбіваецца на будове раллі, бо вапна не выклікае заскару-пленья зямлі. Азот для вырабу нарвэскай салітры бярацца з паветра пры дапамозе сільных электрычных выладоўвань-нях. Ужываецца яна таксама, як і чылійская салетра.

Амонавы сярчан.—гэта злучэньне серчанага квасу з аманьякам $[\text{NH}_4]_2 \text{SO}_4$. Мае ў сябе каля 20% азоту. Серчан—прадукт фабрыкацыі сьвяцільнага газу і коксу. Уплывае менш энэргічна на рост расьліны, чым салетра, затое даўжэйшы час і вада не вымывае яго ў ніжэйшыя слаі.

Амонавы сярчан ужываецца на ўсякіх зямлях, апрача кіслых. Авёс і бульба выкарыстоўваюць амонавы сярчан таксама добра, як і салетру. Буракі ляпей удаюцца на салетры.

Амонавы сярчан не выклікае, як салетра, працэнтнага зьвялічэньня бялкоў у пладох, дзеля чаго ён ляпей на-дасцца пад броварны ячмень, бульбу. Сярчан высываецца пад азіміну з восені. Яго нельга зьмешваць з матэрыяламі, маючымі ў сябе вапну, бо апошня выдзеліе аманьяк—самую каштоўную частку сярчана ў паветра.

Азатняк—ёсьць злучэньне вапны з цянам $(\text{Ca} (\text{CNO})_2)$ мае 18-20 проц. азоту. Азатняк ёсьць атрута для расьлін і толькі тады, калі ён у зямле перайдзе ў салетру, стано-віцца годным для расьлін. Дзеля гэтага азатняк абавязкава трэба ўнасіць загадзя—за 2-3 тыдні перад пасевам збожа і добра зьмяшаць з зямлёй.

Азатняк нішчыць вопратку і шкодна ўплывае на сло-завыя абалонкі носа і вачэй, а таму трэба з ім абходзіцца вельмі асьцярожна.

Попел, як угнаенье.

У тых старонках, дзе вытворчасць сельскае гаспадаркі паднята ў ва ўсіх яе галінах, попел лічаць за вельмі каштоўны гной. У Голяндыі і Бэльгіі, дзе, як вядома, культура лёну стаіць вельмі высока, угнойваюць зямлю пад лён дравяным попелам, або тарфяным. Попел, пасеяны па ўсходах лёну, зьяўляецца добрым сяродкам проціў земляной бляхі і інш. казілек. Па думцы тамтэйшых гаспадароў, ніякі іншы гной не надаецца замяніць попел на ўгнаенье зямлі пад лён, бо толькі праз угнаенье попелам атрымоўваецца тонкае элясьцічнае валакно, якое вельмі цэніцца на фабрыках.

Попел павінен суха перахоўвацца, бо ў праціўным выпадку ён траціць найкаштаўнейшыя для расьлін часткі і дае зусім нязначныя вынікі. Калі няма месца, дзе можна было б перахоўваць попел, то сабраную кучу яго трэба пакрыць зямлёй, ці дзярном. Найляпей для попелу вымураваць у закрытым месцы скоўнік, куды і ссыпаць яго. З усіх гатункаў попелу лічыцца найлепшым — попел з дроў, які мае больш спажыўных частак для расьлін. Попел з торфу мае меншую вартасць за дравяны, бо зьмяшчае ў сабе менш спажыўных частак. Апрача гэтага, якасьць попелу з торфу залежыць ад якасьці самога торфу, з якога ён паходзіць. Чым торф мае больш расьлінных частак, тым болей ён па вартасці прыбліжаецца да попелу з дроў. Калі-ж торф мае ў сябе закесь жалеза ці іншыя шкодныя для расьлін часткі, то ўжываньне попелу з такога торфу ў значнай колькасці, бывае нават і шкодным.

Попел з каменнага вугальля куды менш карысны, чым попел з дроў ці торфу. У мясцох, дзе паляць вугальлем, попел гэты ўжываюць на кампост.

Попел, добра перахоўваны і ня вымыты дажджом, дае добрыя вынікі на ўсіх землях, апроч лёгкіх і бедных пяскоў. Усе бабавыя расьліны, як лубін, канюшына, гарох, люцэрна і іншыя, як таксама лугі, добра адклікаюцца на ўгнаенье попелам. Лугі, угноеныя попелам хутка замяняюць мох і другія шкодныя травы на дзяцельнік, якога перад гэтым і сьледу ня было. Попел расьсяваюць па палі вясной, па лугох — увосень. Як у першым выпадку, так і ў другім, угноеныя попелам месцы трэба забаранваць.

Dejcz.

Рожа ў сьвіней.

Часта гэта хвароба, раз яна ўкаранілася дзе-небудзь, прымушае цэлую вёску і ваколіцу зрачыся на некалькі гадоў гадаваць сьвіней. Страты, якія прыносяць рожа сьвіней нашай гаротнай Бацькоўшчане, непаддаюцца падрахунку. Здаецца, што тутака ходзіць аб некалькі дзiesiąткаў мільёнаў златаў, якія наша вёска што-год выкідае з свайго бюджэту. Сяляне, бачачы гэту навальніцу, абмяжоўваюцца толькі тым, што прапаўшую ад рожы сьвіньню выцягваюць з надворка, ці кідаюць яе ў раку, ад чаго гэтая зло нашае вёскі хутка пераносіцца з аднаго месца на другое. Робіцца ўсё гэта дзеля таго, што мы, сяляне, не ўяўляем ясна, што за прырода гэтай хваробы і як з ей змагацца.

Рожа сьвіней — хвароба пошастная (заразлівая). Хварэюць на яе парасяты і сьвіньні ў больш маладым веку. Палавіна захварэўшых сьвіней гінецць. Больш усяго хварэюць сьвіньні, якія пасуцца каля рэчак. Хвароба гэта перадаецца праз маленькія кічкі (іх можна прыкмеціць толькі праз вельмі павялічваючае шкло — мікраскоп), бактэры рожы; іх шмат у крыві хворай сьвіньні, ў кішках, ў лёгкіх. Дыханьне і кал хворай жывёліны перадаюць хваробу здаровым нават праз паветра.

Хвароба пачынаецца з таго, што сьвіньня перастае есці, трасецца, скура пад брухам чырванее, часта, асабліва пад канец хваробы, цячэ сьліна, бываюць ваніты (варацакі), дыханьне шывкае. Пры гэтым часта бывае запаленьне мозгаў, сьвіньня круціцца, робіцца соннай.

Лячэньне хворых сьвіней пачынаецца з таго, што захварэўшую жывёліну аддзяляюць ад здаровых, гной з хлявоў, дзе стаялі і хадзілі хворыя сьвіньні, вывозяць куды-небудзь далей, зямлю ў хляве перакапваюць на 4 вяршкі, пасыпаюць сьвежай вапнай, сьцены і ўсё, што можна, белыя вапнай, карыты мыюць вадою, у каторай распушчаюна на 1 вядро вады 1 залатнік сулемы. (Сулема вельмі моцная труцізна, з якой трэба абхадзіцца асьцярожна).

Дохлых сьвіней трэба глыбака закапваць у зямлю, а ляпей трупы паліць. Выцягваць іх і кідаць незакапанымі, або няспаленымі, шкодна для цэлай ваколіцы, якой і трэба самой за гэтым сачыць, бо інакш гэта зараза хутка перанясецца і на іх сьвіней.

Лекі пры гэтай хваробе мала памагаюць. Зпачатку хваробы даюць на ваніты (1 залатнік ванітнага каменя на бутэлку вады), потым камфару (1 залатнік), каламель (1 залатнік). Апрач таго можна даваць карболкі, (10—15 капель

на бутэльку 3—4 разы ў дзень. У апошнія часы з паспяхам ужываюць прышчэпку рожы здаровым сьвіньням, ад чаго апошнія не баяцца хваробы.

Хворых сьвіней трэба дзяржаць на чыстым паветры, паіць іх сыраваткай ці вадой з воцтам.

У. Павалковіч.

Лячэньне наравістага каня.

Нораў у коняў лічыцца вэтырынарамі за хваробу, ня здатную для лячэньня.

Але бываюць выпадкі, праўда не заўсёгды, калі гаспадар, патрапляючы сваей жывёле, прымушае яе працаваць. Аднак, трэба сказаць, што праца такой жывёлай вымагае ад гаспадара часам не чалавечага цяпленья і што ніякое біццё каня хваробе не памагае, бо ад гэтага конь толькі горш наравіцца і гатоў паламаць і парваць усю збрую.

Наравяцца коні найчасьцей ад таго, што з імі дрэнна абходзяцца: б'юць, наваліваюць вельмі цяжкі воз, а раз конь ня зможа вязьці яго, то на другі раз ён і сам прывучаецца не цягнуць і лягчэйшы воз.

Калі конь занаравіцца, бяруць камяк зямлі і сунуць яму ў рот. Конь стараецца выкінуць зямлю з рота і пры гэтым забываецца пра свае норавы. Часам гэты спосаб не памагае, то трэба пробаваць другі! З заду да калёс прывязаюць другога каня і паганяюць яго, каб ён цягнуў воз назад. Наравістаму каню не падабаецца, што яго цягнуць назад, пачынае сам цягнуць, як трэба. Яшчэ адзін спосаб, якім я адвучаў каня ад нораву: як толькі конь занаравіцца то бяру яго ў лейцы і дзёржачы крэпка за іх, крычучы „тпру“, Конь думае, што гаспадару трэба, каб ён падаўся назад, робіць праціўнае, што мне і патрабавалася.

К. В.

Як уберагчы гусенят ад здыхаты.

Гусеняты найчасьцейдохнуць у чэрвёню і ліпню м-цах, калі на дворэ стаіць гарачая пагода. Чым гарачэй лета, тым больш здыхае гусенят. Як толькі захварэе гусянё, то яно апускае крыльлі, ходзіць, як п'янае, пішчыць; лапа і дзюба бялеюць; гусянё астаецца ад гурту і нарэшце здыхае.

Ведама, што ў нас на вёсцы гусей заганяюць у маленькі хлявок, дзе яны ноччу выпаражніваюцца ад калу, у якім ад хворых гусей разьвіваюцца мікробы і заражаюць увесь хлеў.

Вось, каб уберагчы здаровых гусей ад хваробы, абавязкава трэба кожны дзень гусячы гной пасыпаць паленай вапнай, або змываць карболкай (карболавым квасам), а лепш за ўсё гусей на нач пакідаць на дварэ і кожны дзень гной чыста зграбаць, а надворак, дзе сядзелі хворыя гусі, пасыпаць вапнай і торфам. Калі ў гэты час гусянё захварэе, то яго зараз-жа адлучаюць ад здаровых.

Пляхтур.

Як прыгатаваць дамовым спосабам тварог.

Добры тварог мае на рынку і добры збыт. На нашы рынкі вырабляюцца шмат тварагу, але, дзякуючы нізкай яго якасці, за яго плацяць вельмі нізкія цэны. Гэта тлумачыцца няўменьнем прыгатаўляць тварагу ў дробных гаспадарках, дзе няма судказнага абсталяваньня.

Але і пры простым абсталяваньні можна зрабіць добры тварог.

Для прыгатаўленьня тварагу неабходна мець цёплы пакой з тэмпературай ня менш 15-16° R., у якім можна было-б квасіць малако.

Калі ёсць дзеравяныя кадушкі, то квасіць малако можна і ў менш цёплым пакоі, толькі трэба паміж сыценкамі кадушак паддзіваць час ад часу гарачую ваду і такім спосабам паддзержваць патрэбную тэмпературу.

Калі квасяць малако ў дзеравянай пасудзіне, то яе трэба дзержаць у чыстаце: мыць з содай або распушчанай вапнай. У нячыстай пасудзіне кіслае малако (сыракваша), ня можа добра выварыцца і мае ня добры смак.

Каб хутка сквасіць малако і каб тварог меў патрэбную кісьліню, неабходна заквашваць яго закваскай, а ў наступны раз можна ўжо карыстацца сыраваткай з-пад тварагу, калі яна добрая.

Закваску робяць так: бярэцца ў ядро малако, з якога зняты жыр на сэпараты. Ядро з малаком завязваецца і ўстаўляецца ў кадушку з гарчай вадой пры 28° R. Гэту тэмпературу трэба паддзержваць на працягу квашанья. Праз 12 гадзін закваска гатова, якую ўзбаўтаюць і льлюць да малака пры 28°R тэмпературы ў колькасці прыблізна 5 проц.

Праз 15-18 гадзін сыракваша гатова. Яна мае бліzkучую паверхню і калі зачэрпаць, застаецца незаплыўшая ямка. Наагул сыракваша непавінна булбаецца.

Каб мець слаісты тварог, трэба сыраквашу здымаць роўнымі пластамі ў круглы цэбар, каб не пераmeshваць. Затым цэбар устаўляюць у гарачую ваду, цяплыня якой непавінна быць больш 45°R. На гэта трэба звярнуць увагу, бо пры адварваньні тварог найчасцей псуець.

Калі тэмпература пры адварваньні—больш патрэбнай, то па краёх кадушкі тварог прыгарае і ўсплывае на паверх у той час, як у сярэдзіне ён зусім халодны. Калі тварог у такім стане будзе гатавацца, то дастаецца $\frac{2}{3}$ яго нягодным.

Пры 43—45° цяпліні тварог гатуецца праз 1 $\frac{1}{2}$ —2 гадзіны, не прыгарае з бакоў і аднальковы, як у сярэдзіне, так і па баках.

Вывараны тварог выкладаецца на стол, засланы пасьцілкай, або ў кош, засланы марляй і калі большасць сыраваткі сьцячэ, тады накладаюць цяжар для канчатковага прасаваньня.

Лепш тварог адразу выкладаць у кош, бо потым ня трэба будзе перакладаць, а толькі зашыць і адправіць для прадажы на рынак. Тэмпература пакою, у якім выкладаюць тварог, павінна быць 8° R. Пры большай—тварог пачынае закiсаць. На сярняцы тварог ляжыць 10—12 гадзін, патым зьлёгка прасуецца і складаецца ў прызначаньня для адпраўкі кадушкі, стараючыся не паламаць.

Каб рабіць запас тварогу, то для гэтага лепш яго выкладаць на рэшата і, як сыраватка сьцячэ, класці тварог у кадушкі, стараючыся не ламаць пластоў; потым устаўляюць у кадушку кружок і крэпка спрасаваць.

Прэс—няроўнаплечны падважнік, стрыжань якога цісне на кружок. Як цяжар, вешаюць пудоваю ці паўпудоваю гіру, або проста скрынку з каменямі.

У час прасаваньня ў кадушках на паверхні тварагу выцскаецца шмат сыраваткі, якую зьліваюць, дадаюць у кадушку тварагу і ізноў прасуюць.

Пры такой прасоўцы пласты тварагу ня так крамсаюцца, за што ён асабліва цэніцца. Поўную кадушку завязваюць і так адпраўляюць на рынак.

Лутц.

Як зрабіць добры сыр.

Каб зрабіць добры сыр, бяруць 10 квартаў збіранага малака, ўліваюць сюды кварту маслянікі і ставяць гэта ў хаце пакуль не ськисне.

Як толькі падойдзе ў гару сываратка, пераліваюць усё малако у клінок і вешаюць яго на 2 дні, пакуль добра не сцягэ. Пасля выкідваюць з клінка ўсю гэту мешуніну ў міску, — соляць, дадаюць кміну, добра вымешваюць ізноў закладваюць у клінок, націскаючы яго камянем, або другім цяжарам.

Л. П.

Як залажыць школку і гадаваць прышчэпы.

Хто з нас нялюбіць і нячоча мець каля сваей хаты прыгожэнькі садок, які апрача хараства, даваў-бы гаспадару і карысьць. Весялей выглядае тая хатка, каля якой пасаджана хаця некалькі дрэўцаў, а пад ваконцамі красуюцца краскі.

Тым часам садоў па нашых вёсках вельмі мала, а тыя, якія і ёсьць, то запушчаны, дрэўцы старыя, дзікія, так што аб карысьці ад іх ня можа быць і гутаркі. А ўсё гэта павінна быць інакш, бо садок патрабуе для сябе вельмі мала месца, ды яшчэ такога, якое можа быць скарыстана адначасна і для другіх мэтаў, як напрыклад пад агарод. Шкада, бо прылажыўшы трохі працы і розуму, можна прыдбаць для гаспадаркі нямала добра.


Перш, калі мы хочам мець карысьць ад свайга саду, то вельмі важна мець сваю школку (разсаднік), бо купляючы дрэўцы, мы часта купляем ня тое, за што нам прадаюць, ды і па якасці дрэўцы могуць быць добрымі толькі са школак добра пастаўленых. Апрача гэтага, дрэўцы дорага і каштуюць, так што ўсё гэта павінна нас змусіць завадзіць свае школкі.

Таму ў гэтым нарысе я пастараюся даць паважаным чытачам „Сахі“ некалькі радаў як залажыць у сябе дома школку і гадаваць прышчэпы, з якіх можна было-б спадзявацца добрых і суадказных нашым умовам гатункаў дрэў.

Каб завясыці школку, перш трэба выгадаваць дзічкі, значыць дзікія яблынікі і ігрушкі, на каторых будзем прышчэпляць. Для гэтага збіраем увосен зярняты дзічак, сеем, пакрываючы на зіму гальлём ялоўцовым, або ляпей, „страфікуём“ іх перш. А робіцца гэта так: бярэцца дзеравяная скрыначка з дзіркамі ў дне, кладзецца на дно чарапкі, вугальле і сыплецца жоўты пясок. На пясок — рад зярнят, пасля ізноў пясок і г. д., пакуль не запоўнім скрынку даверху. Скрынка ставіцца ў склепе, ці закапваецца ў зямлю дзе-небудзь у

засені на аршын глыбінёй, каб не дайшоў мароз. Вясной як адтане зямля выймаецца скрынка і зярнаты сеюцца на лешкі ў радкі і паліваюць. Як вырастуць дзічкі так, што маюць усе па 4 лісткі, трэба іх „пікаваць“ — значыць даставаць з зямлі, палову карэнчыка адрэзаць і перасадзіць на другую лешку, але ўжо радзей. Летам трэба паломь і паліваць дзічкі. Увосень перасаджываюць іх ужо ў школку.

Месца пад школку трэба выбіраць нямокрае, аткрытае, каб дрэўцы прывыкалі да сьцюжы; зямлю трэба перакапаць на аршын глыбінёй, пры гэтым сподняя зямля выкідваецца наверх, а верхняя падніз. Гэткае капаньне называецца „рэгулёўка“. Калі зямля кепская, то дадаюць пад ніз старога, перапрэўшага гною. Калі ўжо зямля гатова, садзім дзічкі на 8 вяршкоў адзін ад другога.



На першым рысунку з лева паказана як трэба вырэзаць ушчэпку; на другім — як трэба надрэзаць кару на дзічцы; на трэцім — як укладаць ушчэпку пад кару дзічкі і на апошнім паказана як трэба абвязаць прышчэп.

У палове ліпня наступнага году трэба дзічкі „акуляваць“. Для гэтага бярэцца зрэз з дрэва добрага і пажаданага гатунку і вострым ножыкам зрэзваем вочка з кавалачкам дрэва. На дзічку нявысака над зямлёй надрэзваем кару ў знак літэра Т, адхіляем кару, садзім туды вочка і завязваем рагожкой. Праз дзён 15, калі лісток адваліцца, вочка прынялося. У наступную вясну прыняты дзічок зрэзваюць, пакідаючы сучок, да каторага прывязваюць вырашцы з вочка расток.

На другі год дагляд за прышчэпамі будзе наступны: гладка зрэзваюць сучок, замазваюць яго мазью. Летам зрэзваем усе галінкі аднізу да паловы, каб гэтым даць магчымасьць хутчэй прышчэпу расці; на трэці год робіцца тое самое, а на чацьверты мажна завадзіць ужо па жаданьню карону, гэта значаць, каб на дрэвцы разьвіваліся столькі галінак, сколькі гэта падабаецца гаспадару. Калі прышчэпы у школцы добра растуць, то тыя дрэўцы, якім вясной зроблена карона, можна ўвосень або ў наступную вясну садзіць у сад.

У. Пасалковіч.

Травень на пчольніку.

Дачакаўшыся, нарэшце цяплейшых дзён, кожны пчаляр павінен пасьпяшыць зрабіць дакладны агляд сваіх раёў. — Выбраўшы цёплы, ціхі і сонечны дзень, трэба кожны вульей аглядзець, акуратна, зьвяртаючы увагу на сілу рою, дабрату маткі, выгляд вошчыны і запас мёду.

Толькі моцныя раі дадуць пчалю карысьць, дзеля гэтага, хто мае ў пчальніку раі слабыя павінен паруціцца іх падмацаваць, каб на пару найбольшага пажытку яны мелі ўжо сілу яго выкарыстаць.

Маючы некалькі слабых раёў паміж большым лікам моцных, можна слабыя паправіць або дадаючы ім па пару рамак крытай чарвы, ўзятай з моцных раёў, або маладой пчалы, або пераставіўшы слабыя на месца сільных, каб ўся лётная пчала з другіх паляцела ў першыя.

Але-ж, калі пчаляр мае наагул мала раёў ды ўсе будуць слабыя, то тады можна іх падмацаваць толькі падкармливаньнем на чарву. Гэта можна рабіць толькі тады, калі рой мае суадказны запас мёду, дзеля кармленьня прыбываючай чарвы. Калі ў вульлі ёсьць 2—3 кілё мёду, то гэта добра, а калі толькі няма, то трэба даць аднаразова толькі сыропу (2 шклянкі цукру і шклянку вады) колькі не хапае да вышэй азначанай колькасьці мёду. Запэўніўшы такі запас можна пачаць падкармліваць. Падкармліваем на чарву рэдкім сыропам (1 шклянка цукру і 2 шкл. вады). Даем яго ў працягу тыдня невялікімі порцыямі. Матка, бачучы гэтакае прыбываньне ежы, шмат больш чэрыць, а вышаўшыя маладыя пчолкі пабольшаць сілу рою. — Прыглядаючыся да крытай чарвы можам ацаніць дабрату маткі. Добрая матка чэрыць роўна, ў кожную каморку кладучы адно яечка. Калі пабачым па пару яечак у адной каморцы, то гэта будзе доказам, што матка ўжо старая і трэба яе ў суадказную пару зьмяніць.

Што тычыцца вашчыны, то глядзім ці няма плястраў вельмі старых, або папсаваных, а таксама ці няма плястраў з трутнёвымі каморкамі. — Старой лічыцца вашчына цёмная, якая ўжо не прасьветваецца. Такую трэба абавязкава ў свой час забраць даючы на месца яе другую маладзейшую, або вузу прымушаючы пчол, каб сабе яе дабудавалі. Плястры цалком папсаваныя, або цалком трутнёвыя забіраем, а калі сустрэнем папсаваныя або трутнёвыя невялікімі кускамі, то гэтыя кускі вырэзваем і на іх месца ўстаўляем кускі цэлай вашчыны з пчалінымі каморкамі.

Пры гэтых абгледзінах раёў дакладна ачышчаем сьценкі і падлогі вульлэў, а таксама дачыста абскрабляем верхнія бэлькі рамак з налеплянага там кіту.

Зрабіўшы такім чынам ў нашых вульях поўны парадак і значыўшы сабе, што ў каторым з іх трэба будзе яшчэ паправіць, будзем мець на воку, што астаецца нам яшчэ заглядаць толькі ад часу да часу і сьлядзіць, як нашы раі разьвіваюцца.

Калі пабачым, што чарва займае ў вульлі ўсе плястры, не выключаючы і першага ад шкляннага лзьверцаў, то тады трэба даць па аднаму плястру пчалінай вощыны, каб матка мела дзе чэрыць.—Хто цэлых плястраў ня мае, можа іх злажыць паасобных кускоў, шчыльна іх дапасававшы ў рамцы і обматаўшы віткай. Пчолы гэтакія кускі пазьлепляюць паміж сабой моцна, а ніткі паперагрызаюць і выкінуць.

Пасья, пабачыўшы, што пчолы ізноў занялі ўсе рамкі і пачынаюць пад рамкамі будаваць вощыну, даём ім рамкі з вузой. Хто вузы яшчэ ня мае можа даць на пару рамак з наклеенымі пачаткамі з натуральнай вощыны; пчолы пацягнуць работу далей уніз. Калі, у які час па каляндару гэта ўсё рабіць, сказаць нельга, бо гэта залежыць ад розных абставінаў: ў першую чаргу ад ліку мядовых расьлін, а далей ад пагоды і сілы раёў.

В. Верас.

Як высушыць сырое памяшчэньне.

(З уласнай практыкі).

Каб высушыць сырое памяшчэньне, трэба ў ім падвесіць з нахілам доску, насыпаць на яе парашку хлёрыстай вапны і паставіць пад канец яе зьніжаны якую-небудзь пасудзіну. Вапна выцягвае вогкасьці ўдвае больш, чым важыць сама. Ад воўгкасьці вапна робіцца рэдкай і сьцякае па дошцы ў пасудзіну.

Ваду можна выпарыць, а вапну пасля выпарваньня можна ізноў скарыстаць.

Замест хлёрыстай вапны ўжываюць для гэтай жа мэты серкавы квас, які разьліваецца ў адкрытыя шклянныя пасудзіны і растаўляюцца па кутках памяшчэньня. Квас убівае ў сябе больш чатырох частак вады і гэтым самым высушвае паветра памяшчэньня. Праца з серкавым квасам павінна быць вельмі асьцарожнай.

А. К.

Доследы з пасевамі бульбы на балоце.

(З матар'ялаў Забалацкай балотнай гаспадаркі).

Дасьледы леташняга году з пасевамі аўса на балоце паказалі, што фосфарнае ўгнаеньне не павялічвае ўраджая.

Данныя аднаго году з адной культуры яшчэ нямагуць лічыцца пэўнымі і затым сёлета *) даслед пастаўлен

*) Даслед зроблен у 1926 г.

другі раз і павялічан пасевамі на балоце збожжа, клубня-плодаў, лёну, канашпель і бабовых.

Тут я хачу спыніцца на выніках вопытаў з бульбаю.

Пасеян быў сорт „Вольтман“ сярэдняй вялічыны, па разліку 80 п. на дзесяціну.

Пры падліку дзялянак асноўнага і паўторнага радоў атрымана ў пераводзе на дзесяціну: Кантроль 440 пуд.; па тамасаўцы — 412 пуд.; па фосф. муцэ — 375 пуд.; па калійнай солі — 1312 пуд.; па кал. солі + тамас. — 1237 пуд.; па кал. солі + фосф. муцэ — 937 пуд.

Як відаць, калійная соль у тры разы павышае ўраджай, а фасфарытныя ўгнаенні, унесеныя асобна ці як дадатак да калійнай солі ўражай зніжаюць.

Зімою будуць праведзены хэмічныя аналізы торфу; яны высвятляць яшчэ пытаньне лябораторна, а пакуль што можна толькі сказаць, што наш тарфянік фосфарных угнаенняў не патрабуе.

Гэта цікавае зьвішча з натуральнага і эканамічнага боку стане тэмай для шэрагу работ на палёх беларускіх гаспадарак; яно прымусіць культурна-тэхнічныя сілы і сялян даследчыкаў пры распрацоўцы балот ня трымацца рацэптаў па ўгнаеньню, а правяраць уплыў кожнага ўгнаеньня на ўласным дасьледзе.

Цяпер зьяўляецца толькі пытаньнем, колькі часу мае ўплыў калійная соль на бульбу. На гэта адказваюць данныя, якія атрыманы, праўда, толькі за 1 год: Без угнаеньня (другі год культуры) 450 пуд. на дзес.; па нормальнаму ўгнаеньню, пакладзенаму ў 1925 г. пад авёс — 637 пуд. на дзес.; па падвойнаму нормальнаму ўгнаеньню 1925 г. пад авёс — 975 п. на дзес.; па ўгнаеньню (15 п. кал. солі і 18 п. тамасаўкі), пакладзенаму ў 1926 г. — 1162 п. на дз.

Соль як відаць мае уплыў на ўраджай бульбы і на другі год, ала слаба (187 п. прыбавкі).

Падвойная норма ўгнаеньня першага году зьберагае вялікі запас угнаеньня і на другі год (525 п. прываўкі); але такі спосаб траціць сваё значэньне, бо першагодняя культура (авёс) ад падвойнага ўгнаеньня дае лепшы ўраджай. Угнаеньне, якое пакладзена непасрэдна пад бульбу, дае прыбаўку ўраджаю ў 712 пуд. (замеот 525 п.).

Данныя і ўчот ураджаю пасеву паказваюць высокую ўраджайнасць бульбы на балоце.

Ва ўсіх выпадках ідзе гутарка аб бульбе сорту „Вольтман“, сярэдняй велічыны, высеянай па разліку 80 п. на дз.

Для высвятленьня пытаньня, якая па велічыні бульба дае найбольшы ўраджай на балоце, была засеяна аднальковая па вазе колькасьць бульбы (3 ф.) на невялічкіх кавалках балота.

Пасля ўчоту ўраджаю аказалася, што: вялікія клубні далі 32,5 фун.; сярэднія—56,25 фун.; дробныя—36,75 фун.; рэзаная ўдоўж—27,80 фун.

Лічба аднаго году паказалі, што найменшы ўраджай дае рэзаная бульба, а найбольшую масу—дробныя бульбіны. Сярэднія бульбіны хоць і даюць меншую масу, але больш, чым буйныя.

Буйныя бульбіны даюць самую вялікую бульбу, але я бывае мала. Сярэдні і дробны пасадачны матэр'ял дае бульбіны буйныя, сярэднія і дробныя.

Адсюль відаць перавага сярэдн. і дробн. (але ні ў якім разе не драбеза ў гарэх) пасадачнага матэр'ялу, якім значна эканоміцца расход на пасеўны матэр'ял. На адным з палёў балотнай гаспадаркі было пасеяна сярэдняй і драбнай бульбы па разьліку на 1 дз. 66 пуд. і ўраджай у сярэднім атрымаўся каля 1000 пудоў.

На падставе даследных даных балотнай гаспадаркі, можна сказаць:

- 1) *ва ўмовах Балотнай гаспадаркі пад бульбу патрэбна толькі калійная соль (15 пуд. на 1 дзясціну).*
- 2) *Калійную соль трэба класыці пад бульбу, якая найбольш ураджайна на сьвежараспрацаваных тарфяніках.*
- 3) *Для пасады трэба браць сярэдні і дробны матэр'ял 70—80 пуд.*

А. Шохар.

Дасьлед з попелам.

Я маю даволі высокую сенажаць і ніколі ў сухі год не атрымліваю добрага ўраджаю.

Параіўшыся са знаёмым аграномам, я адмернуў кавалак сенажаці ў 120 кв. саж. і пасеяў 3¹/₂ п. сабранага попелу, заскарадзіўшы яго бараной з вострымі жалезнымі зубамі. Дзён 20 ня было відаць ніякай розьніцы, але потым угноёная сенажаць пачала адзяляцца ад няўгноенай. Замест сіўцу ды чарнагалоўкі на ўгноеным кавалку вырасла дзяціліна і іншыя карысныя травы, а на няўгноенай—трава была кепская. З угноенай дзялянкі я сабраў 14 пуд. сена, а з няўгноенай такой самай вялічыні—6 пуд.

Такім спосабам, угноеная попелам (70 п. на дзес.) сенажаць дае каля 280 пуд. добрага сена, а няўгноеная—ўсяго каля 120 пуд., кепскага.

Браты, сяляне. бярэце гэты прыклад пад увагу.

Селявін Пляхтур.

Парады агранома.

Пытаньне. 1) Як ляпей садзіць гуркі, якую яны любяць зямлю і што трэба рабіць, каб менш было пустацвету?

2) Ці добра і ў які час вясной баранаваць канюшыну і ці трэба баранаваць насеньне яе?

Надпішчык *Войніч.*

Адказ. Гуркі вымагаюць шмат цяпла і лёгкай добра і загадзя ўгноенай зямлі. Калі дазваляе месца, трэба адводзіць для гуркоў паўднёвыя схілы.

Можна сагрэць зямлю пад гуркі паступным спосабам: на тых месцах, дзе думаюць рабіць лехі, капаюць раўкі глыбінёй каля 2 вяршк., кладуць туды роўна конскага, або каровяга гною, утрамбоўваюць яго і паверх робяць лехі. Ад пераправаньня гэтага гною саграваецца зямля.

Каб гуркі давалі менш пустацвету, рэкамендуецца ўжываць насеньне 3—4 гадоў, ці сьвежае, але такое, каторае ўсю зіму перахоўвалася ў сухім месцы (каля печы).

Ураджаі гуркоў залежыць яшчэ і ад гатунку. Найлепшымі ў нас лічацца: Мурамскія, Вязьнікоўскія і Аксэльскія.

2) Баранаваць канюшынішча вясной вельмі пажадана, бо гэтым мы дапамагам правільнаму доступу паветра ў зямлю і да карэнчыкаў расьлін, што добра адбіваецца на ўраджаю. Адначасна з баранаваньнем рэкамендуецца ўгноіць канюшынішча гіпсам ці вапнай.

Баранаваць канюшынішча трэба ў той час, пакуль яшчэ не крануліся ў рост расьліны.

Што-ж тычыцца баранаваньня насеньня канюшыны, дык пасеў яе лепш рабіць па азіміне, як толькі сыйдзе сьнег. У гэты час зямля топкая і не дазваляе ўзьехаць на яе з конямі і баранамі. Калі-ж канюшыну сеюць па ярыне, дык гэта трэба рабіць зараз-жа пасьяля закрыцьця насеньня яравога, а тады адзін раз праезжаюць па засеянай канюшыне лёгкімі баранамі.

Пытаньне. Ці добра вывозіць гной вясной, калі ў гаспадара ёсьць найбольш часу і ці варта пакідаць яго ў большых кучах?

Г. Татарын.

Адказ. Вывозяць гной пад азімае тады, калі ў гаспадара ёсьць часу. Вывязшы гной на поле, трэба заразжа яго растрасьці і заараць. Калі па якой-небудзь прычыне заараць гной нельга, дык абавязкова ён мусяць ляжаць на ніве растрэсены. Лежачы ў кучах, гной траціць шмат каштоўных частак, аддаючы іх у паветра. Калі-ж ён растрэсены, дык гэтыя часткі прыцягваюцца і задзержваюцца зямлёй.

Пытаньне. Ші варта збіраць попед, каб выкарыстаць яго як штучнае ўгнаенне і ці мае ён для раслін вартасць.

Падп. *М. Лук'яновіч.*

Адказ. Глядзеце артыкулы у гэтым нумары: „Попед як угнаенне“ і „Даслед з попелам“.

Паштовая скрынка.

Гуртку беларускіх студентаў у Празе (чэскай) „Саха“ вам высылаецца акуратна. Супрацоўніцтва ваша вельмі пажадана.

Падпішчыку каршуну. Курадымку для пчолаў можна дастаць у Зыгмунта Нагродзьяго: Вільня, Завальная 11-а. Каштуе 10 зл.

Падпішчыку Татарыну Г. Саджанак жывакосьніку „Саха“ стараецца набыць, каб мець магчымась падзяліцца з гэтай новай і цікавай раслінай са сваімі падпішчыкамі. У сучасны момант рэдакцыі вядомы наступныя гаспадаркі на Беларусі, дзе завялі жывакосьнік: 1) Брозаўскі Вл., Халевічы, р. Ваўкавыск; 2) Глінка Ст., Шчавін, р. Гаварова Беластоцкая; 3) Okręgowe Tow. Podlaska; 4) Гаспадарская школа ў Неневічах (Наваградок); 5) Федаровіч Раман, Шчучын пав. Лідзкі.

Падпішчакам Скалазубу і інш. „Саха“ высылаецца толькі падпішчыкам у той-жа дзень, як выходзіць з друку. Калі не дастаеце, дык звярніцеся да кіраўніка вашае пошты і падавайце жалабу да Дырэкцыі Пошт і Тэлеграфу ў Вільні, што рэдакцыя „Сахі“ з свайго боку ўжо зрабіла.

Прамэтэю. Матэрыял ваш для „Сахі“ дасталі. Скарыстаем у наступных нумарох.

Выдавец. сэн. УЛАСАЎ.

Рэдактар У. ПАВАЛКОВІЧ
Бел. Друкарня ім. Фр. Скарыны, — Вільня, Людвісарская 1.

Приймаецца падпіска

на першую сельска-гаспадарчую часопісь.

„САХА“

месячнік з аб'ёмом каля 240 ста-
ронак у год.

Часопісь ставіць мэтай у навукова папу-
лярнай форме знаёміць наша
сялянства з навінамі арганамічнай навукі і да-
сягненнямі практыкаў-гаспадароў.

Часопісь будзе знаёміць с тымі спосабамі
вядзення сельскай гаспадаркі,
калі можна бяз значных грашавых затрат навялі-
чыць свой прыбытак.

Часопісь будзе імкнуцца, каб на тэрыто-
рыі Заходняе Беларусі ўтва-
рыць інстытут сялян-даследчыкаў і кіраваць іх
працай.

Часопісь будзе карысна сялянству, чыталь-
ням, гуртком, бібліатэкам і г. д.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА ад першаго нумару да
канца году 2 зл. 50 гр. Падпішчыкі будуць
адтрымліваць часопісь толькі па перасылцы
платы.

АДРЭС РЭДАКЦЫІ: Вільня, вул. Сьв. Анны,

№ 2, кв. 3.