

164

ВОДОБОЯЗНЬ.

Свѣдѣнія о предохранительномъ специфическомъ противъ этой болѣзни средствѣ.

СОВРАЛЪ И СОСТАВИЛЪ

А. Д—ій.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Б. Подъяч., № 39.

1884.



ВОДОБОЯЗНЬ.

Свѣдѣнія о предохранительномъ специфическомъ противъ этой болѣзни средствѣ.

1881 издана тѣмъ дѣятельнѣемъ описанной способомъ

СОВРАЛЪ И СОСТАВИЛЪ

А. Д—ій.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Б. Подьяч., № 39.

1884.

82

БОДОРОЗИП.

Все права защищены автором и издателем
издательства "Издательство Сибирь"

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 27 Апрѣля 1884 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Н—Д .А

С-НЕДЕЛЯИП.

СС-И , градоу И , издавателемъ издалииа Г издалииа Г

дата

169

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| | СТР. |
|--|------|
| Вступлениe | 1 |
| I. Бѣшенство собаки | 8 |
| II. Симптомы водобоязни | 11 |
| III. Наружный видъ волосистаго молочая | 12 |
| IV. Приготовлениe лекарства изъ корня волоси- стаго молочая | 13 |
| V. Лечение: | |
| А) Наружныя средства | 15 |
| и Б) Внутреннее средство | 16 |
| VI. Дѣйствiе волосистаго молочая | 18 |
| VII. Диэта | 20 |
| VIII. Другiя рекомендуемыя врачами средства: | |
| А) Высасыванiе крови | 21 |
| Б) Баня | — |
| В) Жарь на разстоянiи | 22 |
| и Г) Марганцевокислое кали | 23 |
| IX. Народныя противъ водобоязни средства: | |
| а) Зараженная кровь | 24 |
| б) Майскiе жучки | 25 |
| в) Шильникъ | — |
| г) Чеснокъ | 26 |
| и д) Особый видъ молочая | — |
| X. Источники | 27 |
| Заключенiе | 28 |

OLYMPUS

| | | |
|----|---------------------------|------|
| 45 | Следует известие | III |
| 1 | Л. Димитров изъезд | I |
| 8 | | |
| 11 | Л. Оникодоров изъезд | II |
| 15 | Л. Н. Григорьев изъезд | III |
| 21 | Л. Н. Григорьев изъезд | IV |
| 25 | Л. Н. Григорьев изъезд | V |
| 31 | Л. Н. Григорьев изъезд | VI |
| 35 | Л. Н. Григорьев изъезд | VII |
| 41 | Л. Н. Григорьев изъезд | VIII |
| 45 | Л. Н. Григорьев изъезд | IX |
| 50 | Л. Н. Григорьев изъезд | X |
| 55 | Л. Н. Григорьев изъезд | XI |
| 60 | Л. Н. Григорьев изъезд | XII |
| 65 | Л. Н. Григорьев изъезд | XIII |
| 70 | Л. Н. Григорьев изъезд | XIV |
| 75 | Л. Н. Григорьев изъезд | XV |
| 80 | Л. Н. Григорьев изъезд | XVI |
| 85 | Л. Н. Григорьев изъезд | XVII |

— — —
 въ земляхъ якъко именованыи Испанія И Греція. Этотъ болѣзнью приводятъ въ съмнѣніе оправданные въ земляхъ Испаніи, Греціи и др. въ земляхъ Италии: Извѣстно, что это изъ земель Европы, а не Азіи, что

Медицина до сихъ поръ остается бессильнао въ борьбѣ съ одной изъ самыхъ ужасныхъ болѣзней — съ водобоязнью, сопровождаемой почти всегда смертельнымъ исходомъ. Но если нѣть дѣйствительныхъ средствъ для излеченія развившейся уже водобоязни, то, къ счастью, есть полная возможность предупредить эту болѣзнь своевременнымъ употребленіемъ предохранительного средства.

Это цѣлебное средство — корень растенія, называемаго по латыни: *Euphorbia silvestris sive villosa*, по русски: (въ буквальномъ перевѣодѣ:) Молочай листной или волосистый, по польски *Ostromlecz kosmaty* по французски: *Euphorbe à feuilles de pin* и по немецки *Wolfsmilch*. Упоминая объ этомъ растеніи ниже, буду называть его въ сокращеніи: *Euphorbia villosa* — волосистый молочай.

Знахарі изъ крестьянъ Каменецъ-Подольской, Волынской и другихъ сосѣднихъ губерній, съ незапамятныхъ временъ употребляли волосистый молочай, какъ предохранительное противъ водобоязни средство, о которомъ, по обыкновенію, сохраняли глубокую тайну, но въ 1825 году, одинъ изъ знахарей, умирая открылъ эту тайну помѣщику Маковецкому, который немедленно сообщилъ ее всѣмъ сосѣдямъ. Въ 1828 году, профессоръ бывшаго Кременецкаго лицея, док-

99
торъ Карлъ Качковскій впервые описалъ характеристику *олосистаго молочая*, а докторъ Косинскій, помѣщики: Маковецкій, Волянскій и другіе, путемъ опыта, убѣдились въ дѣйствительности этого средства, которое и до сихъ порь употребляется противъ водобоязни въ означенныхъ губерніяхъ. Наконецъ жительствующій въ г. Лембергѣ (въ Галиціи:) весьма извѣстный и всѣми уважаемый гомеопатъ, докторъ Антонъ Качковскій, членъ многихъ ученыхъ обществъ и авторъ нѣсколькихъ капитальныхъ, на польскомъ языкѣ, о гомеопатіи сочиненій, подробно описавъ какъ наружный видъ, условія разведенія и свойства *олосистаго молочая*, такъ равно способъ приготовленія изъ онаго и употребленія лекарства, неутомимо и съ неизмѣннымъ успѣхомъ, въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, трудится надъ изцѣленіемъ людей, пострадавшихъ отъ укушенія бѣщенными животными. Этотъ истинный и вполнѣ безкорыстный другъ человѣчества, съ особенной готовностью спѣшить оказать каждому помощь, ведетъ обширную корреспонденцію и пишущему эти строки сообщилъ много разъяснений.

Къ сожалѣнію, наставленія доктора А. Качковскаго, помѣщенные въ нѣсколькихъ, изданныхъ имъ на польскомъ языкѣ лечебникахъ, не только русской публикѣ, но и русскимъ врачамъ почти вовсе неизвѣстны; по крайней мѣрѣ, до сихъ порь *олосистый молочай* ни въ одномъ русскомъ лечебникѣ не показанъ какъ предохранительное отъ водобоязни средство. Дерикеръ въ своей «Фармакологіи» упоминаетъ

объ этомъ ростеніи въ нѣсколькихъ только словахъ, въ своемъ жъ «Сборникъ народно-врачебныхъ средствъ» сдѣлалъ краткое и не вполнѣ точное указаніе, что волосистый молочай почитается средствомъ противъ «развившейся уже водобоязни», тогда какъ онъ со-
ставляетъ предохранительное лишь средство.

Вотъ причины, побудившія меня сгруппировать воедино изданныя въ разное время, на польскомъ языке, наставленія доктора Антона Качковскаго и, пополнивъ ихъ обязательно сообщенными мнѣ поченными авторомъ подробностями, составить настоящую брошюру съ пѣлью изданія ея во всеобщее свѣдѣніе. Для тѣхъ, которые подверглись укушенію бѣшенаго животнаго, не запасшись предварительно лекарствомъ изъ *олосистаго молочая*, помѣщаю въ концѣ описание нѣсколькоихъ другихъ, менѣе, впрочемъ, достовѣрныхъ, средствъ.

А. Д.

а въ ахиллоподѣн а нѣтъоц амотъ гдѣ
сакибъе съ мандариномъ ажъ ажъ
отъ синъоц єонъоц ажъ ажъ ажъ ажъ
тангоа амодѣдѣрѣ ажъ ажъ ажъ ажъ
— 1 —

а жъ ажъ ажъ ажъ ажъ ажъ ажъ ажъ
Бѣшенство собаки.

Бѣшенство, какъ самостоятельная болѣзнь, пора-
жаетъ только собакъ, волковъ и кошекъ; другія же
животныя могутъ подвергнуться ей лишь посредствомъ
укусенія. Люди пострадавши отъ покуса бѣшенаго
животнаго, если слюна его проникнетъ въ кровь по-
страдавшихъ, подвергаются болѣзни, называемой *во-
добоязнью*.

Такъ какъ болѣзнь эта, въ большинствѣ случаевъ,
происходить отъ укусенія бѣшеною собакою, то оз-
накомленіе съ симптомами, предвѣщающими прибли-
женіе и наступленіе бѣшенства собаки, оказывается
настоятельно необходимымъ. При нѣкоторомъ вниманіи
къ болѣзнямъ собакъ, люди рѣже подвергались
бы плачевнымъ послѣдствіямъ неосторожности и не
мало человѣческихъ жизней было бы сохранено.

Безпокойство и угрюмость — это первые признаки
болѣзни. Собака безпрестанно перемѣняетъ мѣсто,
прятчется, боится свѣта, ложится согнувшись и помѣ-
щая голову между грудью и передними лапами, на-
зовъ является, но медленно, какъ бы нехотя, перехо-
дить поперемѣнно ко всѣмъ домашнимъ и на кажда-
го смотреть пристально. Къ своему хозяину и вообще

ко всѣмъ домашнимъ она сохраняетъ однако привязанность и по прежнему ласкается. Хотя она не оказываетъ еще тогда особенаго влеченія къ кусанію, но въ случаѣ нанесенія ей побоевъ, готова укусить даже своего хозяина, — Послѣ нѣкотораго времени, беспокойство увеличивается и переходить въ бредъ: собака то стоитъ неподвижно, то вдругъ бросается и будто ловить мухъ въ воздухѣ, иногда же съ лаемъ бросается на стѣну. Сила и выраженіе всѣхъ припадковъ бываютъ различны, смотря по нраву животнаго: у собаки ласковой беспокойное состояніе выражается какъ то *жалобно*, у сердитой все выраженіе становится *страшнымъ*. Нерѣдко глаза наливаются кровью и всегда имѣютъ необыкновенный блескъ, какъ бы горятъ. Во время этой болѣзни, собака во все не чувствуетъ, какъ многіе полагаютъ, отвращенія отъ воды; напротивъ, охотно ее пьетъ, пока можетъ глотать. Даже при развитіи болѣзни, когда сжатіе въ горлѣ мѣшааетъ глотанію, собака не успѣвая утолить жажду, суетъ морду въ воду.

Бѣшеная собака мало ёсть, но она рветъ, грызетъ, а иногда и проглатываетъ свою подстилку, камешки, куски дерева и прочія несѣбѣдомыя вещи. У нѣкоторыхъ собакъ пасть наполняется пѣнистою слюною у другихъ же, напротивъ, пасть совсѣмъ суха, и тогда собака производить лапами такое около морды движеніе, какъ будто у нея въ глоткѣ или зubaхъ что нибудь завязло. Рвота бываетъ обыкновенная или съ кровью. Лай-беззвучный, глухой, хриплый, басистый, кончается завываніемъ. Бѣшеная собака оказы-
ваетъ

еть нечувствительность къ боли: молчить, когда ее бьютъ. Увидавъ другую собаку, она приходитъ въ ярость и бросается чтобы ее укусить. Это одинъ изъ самыхъ первыхъ признаковъ болѣзни; поэтому, всякая собака, необыкновенно зло бросающаяся на другую собаку, подозрительна въ высшей степени. Часто случается, что заболѣвшая собака скрывается изъ дому и чрезъ день или два возвращается домой въ самомъ бѣдственномъ состояніи: исхудала, въ крови, въ грязи; тогда уже она готова кусать всѣхъ безъ разбора. Бѣшеная собака сначала бѣжитъ съ совершенно свободными движениями, но вскорѣ ноги ея слабѣютъ и побѣжка становится медленнѣе, хвостъ свѣшненный, голова понурена, языкъ синеватый, вывѣшненный, кусаетъ безъ лая, нападаетъ на все живое встрѣчное, но въ особенности на собакъ, такъ что если на пути есть собака, человѣкъ легко можетъ избѣжать опасности. Вѣбѣшившаяся собака не можетъ жить дольше 48 часовъ: она окончательно въ конвульсіяхъ отъ паралича.

При сомнѣніи — здоровая ли собака или бѣшеная надо осторожно привязать ее къ конурѣ и потомъ замахнуться на нее палкою: здоровая собака спрячется въ конуру и будетъ избѣгать удара, бѣшеная же бросится на палку.

жкогоД итвася як сівакод атвасяни котоміцато
піноретен он .твоове де ѿльо эп котыд оте эн
он атвасяк мъуочи атвасяни атвасяни ахноа
ютонаq вілони вімоялженоюю, віоништ ваннгото
квад ас) левкт атвасяни II. кролот, котердому, вінахид
нит йонаходи атвасяни атвасяни (ніякайд німіненішт

Симптомы водобоязни.

Выше было сказано, что если при укушениі бѣшенымъ животнымъ, ядъ его поступить въ кровь человѣка, то, спустя двѣ-три недѣли, а иногда и нѣсколько мѣсяцевъ), онъ подвергается болѣзни, именуемой *водобоязнью*. Вотъ краткое перечисленіе симптомовъ, предвѣщающихъ эту болѣзнь:

Угрюмость, грусть, изнеможеніе, беспокойство, боязливость; головная боль, тугость въ затылкѣ, отсутствіе аппетита, тошнота, затрудненное глотаніе. Съ приближеніемъ пароксизма, у больнаго перемѣняются черты лица, беспокойство увеличивается, глаза искрятся, является дрожаніе мускуловъ, лицо блѣdnѣеть, руки и ноги холодѣютъ, больнаго одолѣваетъ ужасъ ко всему блестящему и къ вѣтру, является большая жажда, но приближеніе посуды съ водою производить у больнаго конвульсіи, онъ старается убѣжать или рвать на себѣ платье, бѣть посуду, кричать охриплымъ, похожимъ на собачій лай, голосомъ, на конецъ кусаетъ всѣхъ и все что попадется. Тогда появляется у него громадная сила: нѣсколькихъ человѣкъ недостаточно для удержанія одного больнаго; а потому, въ промежуткахъ между пароксизмами,

стараются привязать больного къ кровати. Положение это длится не болѣе 36 часовъ, по истечениі коихъ параличъ поражаетъ мускулы, является постоянная тошнота, сопровождаемая иногда рвотою, дыханіе ускоряется, голосъ слабѣеть, глаза (съ разширенными зрачками) вытаращаются, и больной умираетъ отъ задушенія.

III.

Наружный видъ волосистаго молочая.

Покончивъ съ грустной картиной болѣзни, приступаю къ описанію наружнаго вида растенія, составляющаго специфическое, несомнѣнное предохранительное противъ водобоязни средство.

Волосистый молочай (Euphorbia villosa) произрастаетъ въ дикомъ состояніи въ Каменецъ-Подольской, Волынской и другихъ сосѣднихъ съ ними губерніяхъ, на лугахъ и межахъ, возлѣ лѣса или же въ самомъ лѣсу, преимущественно березовомъ и дубовомъ; любить солнце, черноземъ и гористую мѣстность: Стебель этого растенія — на видъ какъ бы поросшій мохомъ — имѣть около аршина высоты, шириной же съ гусиное перо; листья продолговато-острые, цвѣты желто-красные. Корень толщиною съ большой палецъ, сверху темно-коричневаго цвѣта. При над-

рѣзѣ, какъ корень такъ равно стебель и листья извергаютъ клейкий, бѣдоватый, съ виду похожій на сливки, но горькаго вкуса сокъ, прикосновеніе къ которому оставляетъ на тѣлѣ черныя пятна. *Волосистый молочай* цвѣтеть съ половины мая до половины юна и можетъ быть разводимъ во всѣхъ странахъ съ умѣреннымъ климатомъ, какъ на открытомъ воздухѣ, такъ и дома, — въ горшкахъ. Начало весны и поздняя осень считаются лучшимъ временемъ для пересадки этого растенія.

Въ заключеніе считаю не безполезнымъ присовѣ-
купить, что есть много видовъ молочая, но именно
волосистый молочай (*Euphorbia villosa*) оказался
специфическимъ предохранительнымъ противъ водо-
боязни средствомъ.

Приготовленіе лекарства изъ корня волосистаго молочая.

Весною или осенью, лучше всего въ началѣ мая, передъ разцвѣтомъ растенія, или же въ концѣ сентября, добывается свѣжій корень *волосистаго молочая* и, по очисткѣ его отъ земли, изрѣзывается въ мелкіе куски, которые толкутся въ ступкѣ и въ видѣ массы помѣщаются въ новую, небывшую въ упо-

треблениі глиняную, непремѣнно глазированную (муравленную) посуду. Масса эта должна занять собою около трехъ четвертыхъ частей ($\frac{3}{4}$) посуды, которая затѣмъ наполняется почти до краевъ горячею водою и послѣ плотнаго прикрытия, съ замазкою краевъ крышки тѣстомъ или глиною, вставляется на 24 часа въ горячую печь при такой температурѣ, какая бываетъ послѣ испеченія хлѣба. По вынутіи этой посуды изъ печи, жидкость процѣживается въ другую чистую посуду, напримѣръ бутылку, на которой дѣлается надпись: «*Настой № 1, для внутренняго употребленія*»; на оставшуюся же массу снова наливается горячая вода, посуда замазывается вышеуказаннымъ способомъ и ставится въ горячую печь, но только на 12 часовъ, затѣмъ жидкость опять процѣживается, съ выжиманіемъ на этотъ разъ массы, и сливается въ другую бутылку съ надписью: «*Настой № 2 для наружнаго употребленія*».

Если бутылки будуть плотно закупорены, а пробки залиты смолою, сургучемъ или воскомъ, то лекарство можетъ сохраниться около полугода; по истеченіи же этого времени, а при небрежной закупоркѣ и ранѣ, оно дѣлается къ употребленію негоднымъ.

Желая имѣть засушенный корень *волосистаго молочая*, для сохраненія его въ прокѣ, необходимо: изрѣзать его въ мелкіе куски, высушить ихъ въ тѣни и, впредь до употребленія, держать въ сухомъ мѣстѣ, въ чистой, новой, стеклянной, фарфоровой или глиняной муравленной, плотно закупоренной посудѣ. Тогда корень хорошо сохранится въ теченіи трехъ

и болѣе лѣть, и изъ него во всякое время, можетъ быть приготовленъ настой.

Нежелающіе заниматься разведеніемъ волоистато молочая и приготовленіемъ изъ него настоя, могутъ пріобрѣсти въ аптекѣ, приготовленную тамъ изъ этого корня, на спирту, тинктуру: «*Tinct Euphorbia villosa*», которая, при условіи сохраненія ея въ герметически закупоренной посудѣ, можетъ быть годна къ употребленію тоже въ теченіи полугода.

Докторъ А. Качковскій удостовѣряетъ однако, что домашній настой дѣйствительнѣе аптечной тинктуры.

Въ случаѣ укушенія человѣка бѣшенымъ животнымъ, необходимо, какъ можно скорѣе промыть рану (одинъ лишь разъ) водою, смѣшанною съ уксусомъ и солью въ слѣдующемъ размѣрѣ: четверть бутылки уксуса смѣшать съ бутылкою чистой воды, въ которой растворить 4 столовыя ложки безъ верха (т. е. 6 лотовъ) обыкновенной столовой соли. При недостаткѣ уксуса, вода съ солью признается достаточнаю.

Леченіе. I. А. н.

A. НАРУЖНЫЯ СРЕДСТВА.

Въ случаѣ укушенія человѣка бѣшенымъ животнымъ, необходимо, какъ можно скорѣе промыть рану (одинъ лишь разъ) водою, смѣшанною съ уксусомъ и солью въ слѣдующемъ размѣрѣ: четверть бутылки уксуса смѣшать съ бутылкою чистой воды, въ которой растворить 4 столовыя ложки безъ верха (т. е. 6 лотовъ) обыкновенной столовой соли. При недостаткѣ уксуса, вода съ солью признается достаточнаю.

Всльдъ затмъ выжать изъ раны по возможности болѣе крови и иѣкоторое, впрочемъ, непродолжительное время, поддерживать кровотеченіе изъ раны, въ которую влить достаточное количество домашняго настоя № 2 волосистаго молочая. Потомъ стаканъ переваренной и остуженной воды смѣшать съ такимъ же количествомъ этого настоя № 2 или съ одной столовой ложкой аптечной тinctуры *Euphorbia villosa* и жидкость эту употреблять, какъ для ежедневнаго промыванія раны (по одному разу въ день), такъ и для прикладыванія къ ранѣ холодныхъ, хорошо выжатыхъ компрессовъ, которые перемѣнять по мѣрѣ высыханія, т. е. по крайней мѣрѣ каждые два часа; подъ компрессъ, т. е. непосредственно на рану, класть кусокъ полотна, пропитанный тою же жидкостью. Какъ ежедневнаго промыванія раны такъ и компрессы продолжать до тѣхъ поръ, пока рана не заживеть.

и Б. ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО.

Независимо отъ употребленія наружныхъ средствъ необходимо немедленно же послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ приступить къ пріему лекарства и внутрь. *Въ теченіи трехъ дней* дается больнымъ, по одному разу въ день, утромъ на тощакъ, домашній настоя № 1 волосистаго молочая:

- а) Мужчинамъ крѣпкаго сложенія по *три столовыхъ ложки* заразъ;
- б) Мужчинамъ слабымъ и нервнымъ, а равно женщинамъ — по *две ложки*.

в) Юношамъ и молодымъ дѣвицамъ — по одной ложечкѣ.

и г) Дѣтямъ: до 2-хъ лѣтъ — по одной чайной ложечкѣ, отъ двухъ до 5-ти лѣтъ — по две чайныхъ ложечки и отъ 5-ти до 10 лѣтъ отъ половины до полной столовой ложки за разъ.

Кто пожелаетъ, вмѣсто домашняго настоя, употреблять аптечную, приготовленную на спирту, тинктуру волосистаго молочая (*Tinct. Euphorb. villosa*), тотъ долженъ принимать ее въ двухъ ложкахъ отварной, но остуженой, или же дистилированной воды, въ теченіи пяти дней, по одному разу въ день, утромъ на тощакъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ: въ первый день — 5 капель, во второй — 10, въ третій — 15, въ четвертый — 20 и въ пятый день — 25 капель. Лицамъ нервнымъ, нѣжнаго сложенія, юношамъ и дѣтямъ должны быть назначены меньшіе пріемы, начиная съ 2-хъ и кончая на 10-ти или 15-ти капляхъ, напр: въ первый день — 2 капли, во второй — 4, въ третій — отъ 5 до 7, въ четвертый — отъ 7 до 10-ти и въ пятый — отъ 10 до 15 капель за разъ.

Хотя опытомъ дознано, что для предупрежденія водобоязни достаточно давать пострадавшему домашній настоя № 1 въ теченіи трехъ дней или аптечную тинктуру въ теченіи пяти дней, однако, на всякий случай, совѣтуютъ, послѣ 14-ти дневнаго отдохна, повторить означенный выше курсъ лечения; на конецъ, при двухъ слѣдующихъ новолуніяхъ, давать

на тощакъ по одному пріему лекарства, въ размѣрѣ предписанномъ для первого дня леченія.

Еслибы пациентъ, по поводу судорогъ въ глоткѣ, не могъ принимать лекарства въ жидкомъ видѣ, то совѣтуется давать ему показанное количество капель тинктуры въ истолченномъ мелкому сахарѣ.

Примѣчаніе. Хотя цѣль настоящей брошюры составляетъ описание способовъ *предохраниенія отъ водобоязни людей*, но при этомъ не безполезно замѣтить, что то же лекарство — *волосистый молочай* — *предохраниетъ отъ бѣшенства и домашнихъ животныхъ*, пострадавшихъ отъ укушенія. Лопа-дамъ и рогатому скоту дается ежедневно, въ теченіи трехъ дней, по 6 столовыхъ ложекъ *настола № 1*, собакамъ и кошкамъ по двѣ ложки въ молокѣ. Если не захотятъ выпить этой порціи, выдержать ихъ на голодаѣ, пока не выпьютъ. Діэта заключается въ томъ, чтобы больныхъ животныхъ не подвергать большому холоду и жарѣ, обращаться съ ними ласково и подавать имъ въ изобилии здоровый кормъ и хорошую воду.

VI.

Дѣйствіе волосистаго молочая. Къ употребленію *волосистаго молочая* указаннымъ выше способомъ необходимо приступить безотлага-тельно и во всякомъ случаѣ *не позже шестаго дня* послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ, такъ какъ при этомъ лишь условіи можно ручаться за преду-

177

прежде водобоязни. Въ практикѣ доктора Антона Качковскаго, не только не встрѣчалось ни одного случая безуспѣшности своевременно предпринятаго леченія, но ему удавалось иногда предупреждать водобоязнь и при замедленномъ началѣ леченія; въ послѣдній случаѣ, онъ обыкновенно предписывалъ пациенту пройти курсъ леченія, вмѣсто двухъ, три раза, съ 14-ти дневнымъ, каждый разъ, отдыхомъ и затѣмъ повторить приемы лекарства при трехъ слѣдующихъ новолуніяхъ. Примѣры изцѣленія особенно трудныхъ пациентовъ докторъ Качковскій приводить въ своихъ лечебникахъ поименно.

Хотя волосистый молочай не оказываетъ на организмъ человѣка никакого вреднаго вліянія, но временно причиняетъ нѣкоторые болѣзnenные симптомы, а именно: послѣ приема лекарства, больной чувствуетъ (кромѣ тепла въ желудкѣ) тошноту съ позывомъ на рвоту, головную боль, изнеможеніе, сжиманіе глотки и судороги въ желудкѣ, облегчающіяся отъ питья горячей воды; иногда является поносъ и рвота пищею или желчью. — Если всѣ эти симптомы оказываются въ сильной степени, въ особенности поносъ или рвота, то слѣдующій приемъ лекарства надо нѣсколько уменьшить; въ противномъ же случаѣ, т. е. при слишкомъ слабомъ дѣйствіи лекарства, слѣдующій приемъ необходимо увеличить на половину, т. е. на 50 процентовъ.

Нѣкоторые утверждаютъ, что только у дѣйствительно зараженныхъ дѣлается рвота, у незараженныхъ же — одна дурнота или тяжесть головы.

автома відтіло, фантазії та пісевододороги, які відповідають за залози VII. високоманіжеві каші та стадіонічні відхилення, які відповідають за залози VIII. Дієта.

Послѣ приема лекарства больной долженъ лечь на два часа въ постель, затѣмъ можетъ встать и позавтракать однимъ блюдомъ. Въ дни приема лекарства обѣдъ тоже долженъ состоять изъ одного только блюда. Дозволяются супъ съ кускомъ говядины, говядина съ овощами, каша съ молокомъ или масломъ, свѣжее молоко съ бѣлымъ или чернымъ хлѣбомъ и вообще всѣ легкія и удобоваримыя кушанія. Чай, кофе, крѣпкіе напитки, пряности; копченый, жирный, кислый и очень соленые блюда безусловно запрещаются въ теченіи, покрайней мѣрѣ, трехъ мѣсяцевъ. Необходимо избѣгать также большой физической усталости и въ особенности всѣхъ душевныхъ волненій.

Въ первомъ відхиленіи відповідає залозамъ VIII, а во второму — залозамъ VII. Каші відповідають за залози VIII.

Другія рекомендуюмые врачами средства.

Хотя своевременное употребление *волосистаго молочая* несомнѣнно предохраняетъ отъ водобоязни, однако въ случаѣ неимѣнія этого лекарства подъ рукою и при невозможности достать его, когда понадобится, не мѣшаетъ испытать другія, менѣе впро-

чемъ достовѣрныя, но во всякомъ случаѣ безвредныя и рекомендуемыя нѣкоторыми врачами средства, а именно: *пружинка златою* (шарикъ изъ золота), *златою* (шарикъ изъ золота опкомъ) и *златою* (шарикъ изъ золота опкомъ). А. Высасываніе крови.

Если въ первую минуту послѣ укушенія, представится возможность высосать кровь изъ раны, то нужно воспользоваться этимъ средствомъ, которое для сосущаго совершенно безопасно, ежели у него ни на губахъ, ни во рту нѣть ссадины или царапины, чрезъ которую ядъ могъ бы проникнуть прямо въ кровь. Проглатывать высосанного, конечно, не слѣдуетъ, хотя дознано опытомъ, что всѣ животные яды можно проглатывать безъ опасности.

Б. Баня.

Американскій докторъ — гомеопатъ К. Герингъ соѣтуетъ выдержать больнаго нѣсколько разъ въ русской паровой банѣ. Графъ Коссаковскій указываетъ на излечение водобоязни паровою бaneю, употребляемою по два раза въ день. Нѣкоторые французскіе врачи соѣтуютъ ежедневно употреблять баню при температурѣ отъ 45° до 75° .

Докторъ — гомеопатъ А. Качковскій находить, что баня можетъ почитаться хорошимъ вспомогательнымъ средствомъ при леченіи водобоязни, но онъ не соѣтуетъ бывать въ банѣ во время леченія, т. е. въ дни приема *волосистаго молочая*, дѣйствіе котораго

можетъ быть, въ такомъ случаѣ, ослаблено; по окончаніи же приемовъ лекарства полезно бывать, чрезъ день, въ банѣ, имѣющей столь высокую температуру, какую только можно выдержать; потомъ лечь въ постель и хорошо прикрыться съ цѣлью возбужденія сильной испарины.

В. ЖАРЪ НА РАЗСТОЯНИИ.

Послѣдователи старой медицины обыкновенно прибѣгаютъ къ *прижиганію* раны, съ цѣлью разрушенія тканей и воспрепятствованія поступленію яда въ кровь; но цѣль эта, очевидно, не можетъ быть достигнута, такъ какъ кровь, въ своемъ обращеніи, проходитъ тѣло въ 30 секундъ.

Гомеопаты рекомендуютъ, вмѣсто прижиганія — *жаръ на разстояніи*, т. е. приближеніе раскаленнаго желѣза на столь близкое отъ раны разстояніе, на сколько это окажется возможнымъ безъ прикосновенія. Свѣжую рану, предварительно обмытую уксусомъ, подвергаютъ дѣйствію такового жара до тѣхъ поръ пока пациентъ не почувствуетъ лихорадочной дрожи, озноба и потяготы. Операцию эту повторяютъ по два или по три раза въ день, пока рана не заживеть совершенно и рубецъ не приметъ натурального цвета кожи, тогда можно надѣяться, что ядъ выведенъ или ослабленъ помощью возбужденнаго жаромъ обратнаго нервнаго тока. — Если, по прошествіи 7 или 8 дней, вмѣстѣ съ лихорадочными

движениями, покажется подъ языкомъ прыщикъ, то слѣдуетъ вскрыть его остріемъ ножа и выполоскать ротъ воднымъ растворомъ поваренной соли.

и Г. МАРГАНЦЕВОКИСЛОЕ КАЛИ.

(*Kali hypertmanganicum.*)

Водный растворъ марганцевокислого кали — это превосходное средство для дезинфекціи воздуха — давно употребляется гамеопатами въ видѣ примочки, противъ гнильыхъ, гангренозныхъ, раковидныхъ, костоѣдныхъ и другихъ язвъ, въ которыхъ онъ быстро уничтожаетъ зловонные продукты разложенія, ограничиваетъ и улучшаетъ нагноеніе.

Въ послѣднее время спринцованіе раны этимъ растворомъ (одна часть *кали* распускается въ ста частяхъ воды, по вѣсу) оказалось столь дѣйствительнымъ средствомъ противъ укушенія ядовитаго змѣя, что, открывшій это противоядіе профессоръ Ласе рда щедро награжденъ Бразильскимъ Императоромъ, подарившимъ ему 20.000 долларовъ.

Это открытие наводитъ врачей на мысль, что такое же спринцованіе должно оказаться дѣйствительнымъ и при ранахъ произшедшихъ отъ укушенія бѣшеными животными. Остается ожидать подтвержденія этого предположенія путемъ опыта.

от гнилии и гноя и отеческой, нижеоже
аталоологии и вон-америко от азиатской аталь-
илюс йоницкого гидробиота и гидробиота
IX.

Народные противъ водобоязни средства.

Междь народными средствами есть много дѣйству-
ющихъ на человѣческій организмъ разрушительно;
нѣкоторыя же изъ нихъ, не только оказываются без-
вредными, но, принося во многихъ болѣзняхъ пользу,
дѣлаются впослѣдствіи достояніемъ медицины.
Волосистый молочай многие годы тоже считался
только народнымъ средствомъ, пока изслѣдованія и
опытыпольскихъ врачей, преимущественно же до-
ктора А. Качковскаго, не доказали полнаго права
этого лекарства на подобающее въ фармакологіи
место.
Признавая поэтому, что безусловное порицаніе всѣхъ
народныхъ средствъ было бы неблагоразумнымъ, я
помѣщаю ниже нѣсколько наиболѣе употребитель-
ныхъ противъ водобоязни, съ совѣтомъ, впрочемъ,
прибѣгать къ нимъ только въ крайности, т. е. за не-
имѣніемъ *волосистаго молочая*.

Укушенному совсѣмъ спустя нѣсколько минутъ
послѣ укушения (т. е. когда ядъ вполнѣ проникнетъ
въ кровь), наколоть себѣ палецъ и выпустить нѣ-

сколько капель крови въ стаканъ воды, которую за-тѣмъ выпить. Другіе поясняютъ, что надо наколоть кончикъ именно указательнаго пальца лѣвой руки и выпустить 9 капель крови въ стаканъ парнаго моло-ка, которое взболтать и выпить.

Не придавая значенія этимъ подробностямъ, нель-зя не замѣтить, что дѣйствительность описаннаго динамико-химическаго средства, съ гомеопатической точки зрѣнія, представляется довольно вѣроятнымъ.

б) Майскіе жучки. (Л. II)

(*Meloë majalis*, *meloë proscarabaeus*).

Въ Литвѣ, Бѣлороссии и Малороссии, въ меду со-храняютъ майскіе жучки (майки) и употребляютъ ихъ противъ водобоязни, внутренно и наружно въ видѣ порошка (чайная ложечка въ чашкѣ борща), при каждой перемѣнѣ луны, въ теченіи мѣсяца.

в) Шилыникъ или Встеклынецъ.

(*Alisma plantago*).

Изъ корня этого растенія приготавлиаютъ порошокъ, который даютъ больному съ хлѣбомъ, въ теченіи шести недѣль, ежедневно, въ количествѣ отъ одной до двухъ драхмъ.

— въ отчего идёт название изъ языка сирийского арабскаго
— арабомъ один отъ г) Чеснокъ.
— пахъ чеснокъ (Allium sativum).

Промыть рану водой, крѣпко натираютъ ее чеснокъ; затѣмъ въ теченіи 9 дней заставляютъ больна-
го пить сильный настой изъ чеснока и долго еще въ
кушаньяхъ употреблять чеснокъ. Средство это осо-
бенно распространено въ Италии и Испаніи.

и д) Особый видъ молочая.

(Euphorbia nicacensis).

Настоящая брошюра посвящена подробному описанію *предохранительного* противъ водобоязни леченія посредствомъ корня растенія *волосистаго моло-
чая* (*Euphorbia villosa*); но вотъ въ издающейся въ
С.-Петербургѣ газетѣ «Свѣтъ» (1882 года № 46)
помѣщена была статья, удостовѣряющая что даже
вполнѣ *развившаяся водобоязнь* излечивается особымъ
видомъ молочая, называемымъ *Euphorbia nicacensis*.
Неутомимый труженикъ на пользу науки и стражду-
щаго человѣчества, докторъ А. Качковскій, которому
пишущій эти строки сообщилъ означенную статью,
выписалъ уже къ себѣ въ г. Лембергъ растеніе
Euphorbia nicacensis для размноженія и производства
опытовъ. — Былобы желательно чтобы и другие вра-
чи испытали это средство на людяхъ и животныхъ.

X.

Источники.

Во избѣжаніе испещрѣнія текста, столь утомительными для читателя частыми ссылками, привожу здѣсь одновременно фамиліи всѣхъ авторовъ и заглавія книгъ, которыми я пользовался при составленіи настоящей брошюры:

- 1) *Kaczkowski Antoni.* Prezerwatywne środki dla zapobieżenia zarazie bydlecj, ospie owczej i wscieklinie. Lwów, 1866.
- 2) *Kaczkowski Antoni.* Teoretyczna i praktyczna nauka homeopatyi. Lwów. 1876.
- 3) *Kaczkowski Antoni.* Teoretyczna i praktyczna nauka weterynaryi homeopatycznej. Lwów. 1882.
- 4) *Kuczyński Stefan.* Terapia popularna homeopatyczna. Warszawa. 1884.
- 5) *Дерикеръ В.* Сборникъ народно-врачебныхъ средствъ. С.-Петербургъ. 1866.
- 6) *Дерикеръ В.* Народный лечебникъ. С.-Петербургъ. 1881.
- 7) *Дерикеръ В.* Журналъ гомеопатического лечения. С.-Петербургъ. 1862. № 13.
- 8) *Дерикеръ В.* Журналъ С.-Петербургскаго общества врачей-гомеопатовъ. С.-Петербургъ. 1872. № 3.
- 9) *Геринъ К.* Домашній врачъ-гомеопатъ. Москва. 1851.

- 10) Газета «Свѣтъ». С.-Петербургъ. 1882. № 46.
11) *Le comte Kossakovsky. Essai de m decine pratique et recueil de recettes populaires.* Paris. 1858.
12) *Zeitschrift des Berliner Vereines hom opathischen Aerzte.* II Band. Heft IV. Marz. 1883.

Кромѣ вышеприведенныхъ изданий, источниками для составленія настоящей брошюры служили, полученные мною въ теченіи 1882 и 1883 гг. частные письма доктора Качковскаго, восполнившия нѣкоторые пробѣлы, и давшія мнѣ возможность сдѣлать много такихъ разъясненій и дополненій, которыхъ нѣть ни въ одномъ изъ польскихъ его изданий *).

Въ заключеніе остается пожелать, чтобы всѣ интеллигентныя силы общества, въ особенности сельскіе священники, народныя учителя, редакторы газетъ и издатели календарей оказали содѣйствіе въ распространеніи свѣдѣній о способахъ предупрежденія добоязни, и приохотили сельское населеніе къ разведенію волосистаго молочая, что въ свою очередь несомнѣнно повело бы къ значительному уменьшенію числа жертвъ, ежегодно погибающихъ отъ этой болѣзни.

*) Во время набора этой брошюры получено грустное извѣстіе о кончинѣ незавѣннаго доктора Антона Качковскаго, послѣдовавшей въ Лембергѣ 21 апрѣля (3 мая) 1884 года.

закономъ о пресечении незаконнаго извѣстія о кончинѣ доктора А. Качковскаго

„ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ВѢСТНИКЪ“.

Это издание предпринимается при участіи С. Петербургскаго общества Врачей-Гомеопатовъ, а равно иногородныхъ и заграничныхъ гомеопатовъ. Цѣль журнала: 1) распространеніе въ обществѣ, здравыхъ и точныхъ понятій о гомеопатіи; 2) ознакомленіе съ современнымъ положеніемъ гомеопатіи во всѣхъ государствахъ Европы и Америки и 3) сообщеніе фактовъ гомеопатического лечения.

Въ этихъ видахъ «Гомеопатический Вѣстникъ» будетъ выходить по слѣдующей программѣ:

1) **Терапія.** Правила гомеопатической терапіи въ приложениі къ леченію разнородныхъ болѣзней. Практическія наблюденія. Вспомогательные средства. Новѣйшія открытія и усовершенствованія въ медицинѣ. Приложеніе гомеопатіи къ леченію животныхъ.

2) **Фармакология.** Материалы для гомеопатической фармакологии. Извѣстія о гомеопатическомъ изслѣдованіи лекарствъ. Открытія новыхъ врачебныхъ средствъ и ихъ дѣйствія, а равно дополнительные наблюденія средствами уже извѣстными. Токсилогическая наблюденія — случаи

181
отравленія. Новыя средства и предложения другихъ школъ. Народно-врачебныя средства.

3) **Гигіена и дізтетика.** Статьи о сохраненіи здоровья вообще и о предохранительныхъ мѣрахъ противъ эпидеміи и другихъ болѣзнетворныхъ вліяній на людей и животныхъ.

4) **Історія и статистика** гомеопатіи. Свѣдѣнія о положеніи и успѣхахъ гомеопатіи во всѣхъ странахъ свѣта. Извѣстія о гомеопатическихъ Обществахъ. Собрания, конгрессы, протоколы, рѣчи и лекціи. Отчеты больницъ и лечебницъ.

5) **Литература.** Обозрѣніе книгъ и журналовъ.

6) **Некрологъ.** Біографические очерки.

7) **Смѣсь.** Замѣтки, краткія извѣстія.

8) **Корреспонденція.**

9) **Объявленія.**

Журналъ выходитъ въ послѣднихъ числахъ каждого мѣсяца, въ объемѣ отъ 1—2 листовъ въ 8-ю долю. Цена годовому изданію, съ доставкою, **ТРИ** рубля. Подпись принимается исключительно въ Центральной Гомеопатической Аптекѣ. (Гороховая, 15).

Редакторъ-Издатель **Ф. К. Флеммингъ.**

НОВЫЯ КНИГИ:

Гомеопатическое лечение предъ судомъ третьяго отдѣленія королевскаго суда въ Лейпцигѣ. Доктора Гейничке. Переводъ съ иѣ-менскаго, С.-Петербургъ, 1884 г. Цѣна 50 к. съ перес.

Что такое электрогомеопатія? Электро-гомеопатической способъ лечения болѣзней Графа Маттей, С.-Петербургъ, 1884 г. Цѣна 35 к., съ перес. 40 к.

Сонъ безъ наркотизаціи. Замѣтки доктора Scheldon H. Taliots. Перев. съ англійскаго, С.-Петербургъ, 1884 г. Цѣна 15 к. съ пер.

Гердъ. Сравнительныя результьаты алло-патического и гомеопатического способа ле-ченія. С.-Петербургъ. Цѣна 20 к. съ перес.

Руководство гомеопатическаго лечения. Доктора Медиц. фонъ-Дитмана. С.-Петербургъ, 1884 г. 2 тома. Ц. 4 р. съ перес.

Бутлеровъ, А. М. Антиматеріализмъ въ наукахъ, нейтральный анализъ Іегера и гомеопатія. С.-Петербургъ, 1884 г. Цѣна 40 коп.

Гезенъ, док. мед. Гдѣ больше раціональ-ности, въ аллопатіи или гомеопатіи. С.-Пе-тербургъ. Цѣна 30 к. съ перес.

Грауфогль. Гомеопатический законъ по-добія. Открытое письмо къ профессору барону фонъ-Либиху. Цѣна 75 к. съ пер.

823

HOBPIR KHNIN:

Любопытное изложение
записок о погодных
 явлениях в Киргизии
 в 1881 г. в исполнении
 А. А. Симонова.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.

Составлено и издано
 А. А. Симоновым
 в 1881 г. в Киргизии
 для распространения
 среди киргизов.