

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ЖУРНАЛ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ.

140519

І сярэбраны медаль «Саха» атрымала на Віленскай
гаспадарскай выстаўцы за стацыі аб насенні

г 1913

Цана кніжкі 5 мк. з перасылкай почтаю.
Падпіска прымаецца не на месяцы, а на лік кні-
жак у парадку іх выхаду у свет.
6 кніжан—30 мк., 12 кніжан—60 мк.

З Ў М Е С Т:

- 1) Кармленне кароу.
- 2) Харчаванне кароу пры даенні.
- 3) Гадуўце козы.
- 4) Гадоўля кролікаў.
- 5) Якую лялей рабіць падсяцілку.
- 6) Распрацоўка ялавін на гліста-вільготных і бала-
дзінных глебах.
- 7) Сарадэлі.
- 8) Няхваткі трохполья.
- 9) Дагляд табакі.
- 10) Як треба врэзваць цвёт і бакавыя галіны.
- 11) Штучнае рэньне пчол.
- 12) Як усьцерагчы гуснят каб ня дохлі.
- 13) Мураўніны яйкі як покорм для куранат.
- 14) Палука саду.
- 15) Аб карысці розных дрэваў.
- 16) Заразныя хваробы сьвіней.
- 17) Косці.

Адрэс: Менск, Міцкевічава вул. 99—8.

2 сярэбр. медаль «Саха» атрымала на Менскай гас-
падарскай выстаўцы за стацыі свае аб гаспадарцы
г 1914



Год 1920.

2-я кніжка.

„САХА“

Першы беларускі журнал сельскай гаспадаркі пачаў
ізноу выходзіць у сьвет.

Цана кніжкі 5 марак з дастаўкай.

Падпіска прымаецца на лік кніжак у парадку іх
выхаду. 6 кніг—30 м., 12 кніг—60 марак.

Адрэс рэдакцыі: **Менск, вул. Міцкевіча**
(Захараўская) 99—8.

Рэдактар: *А. Уласаў.*

Выдавец: *Беларускі Цэнтральны Саюз
сельскай гаспадаркі.*

Прымаецца падпіска на газэту

БЕЛАРУСЬ

- | | |
|--|---|
| у Менску, Белар. Дом, вул. А. Міцкевіча. | У Вільні, Беларус. кнігарня Завальная, 7. |
| » Слуцку, Беларускі Нацыянальны Камітэт. | » Варшаве, Бел. Нац. Камітэт, Шпітальн. 1, кв. 3. |
| » Баранавіч, Бел. Паятов. Рада Шасовая 168. | » Горадзе, Бел. Нац. Камітэт. |
| » Вільні, Цэнтр. Рада Віленшчыны і Горадзен. | » Ігумене, Бел. Нац. Камітэт, Школьная вул. |
| Вострабрамская, 9 | » Бабруйску, Бел. К.-Прас. арг. |
| | » Навагруд, Бел. Паят. Рада |

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

на год 180 м.	на тры месяцы 55 м.
» паўгода 100 м.	» месяц 20 м.

з перасылкай.

Цана аднаго нумару 2 маркі.




Карменне кароў.

Ня раз ужо пісалася аб тым, што вялікую абмылку маюць тые гаспадары, якіе кароў сваіх лічаць толькі за машыны для пераробкі гною. Наадварот: карова павінна і можа з лішкаю заплаціць малаком за свой корм і дагляд, а гной павінен заставацца дарма.

Але, каб карова давала даход, а гной—прыходзіўся дарма—трэба карміць яе, як вымагае натура жывёлы; трэба даваць ёй такі і столькі корму, каб хапала яго ня толькі для жыцця самой каровы, але і для вырабкі малака.

Кожны корм мае ў сабе большую, ці меншую частку пажывы, якая толькі тады пойдзе на карысьць жывёле, калі яна распусьціцца ў сьліне і ў соках жывата і кішок; залежна ад гэтых сокаў будзе з таго самага корму болей, або меней і карысьці для жывёлы.



Жывот каровы.

А. Месца, кудэю праходзе яда; 1, жвач (рубей); 2, сетка; 3, кніжка; 4 сьчуг; Б. прываратнік; В. пачатак тонкіх кішок.

Ператраўліваньне корму пачынаецца найперш у роце, дзе сьліна жывёлы, маючы ў сабе так званую „пціаліну“, замяняе нераспушчаючыся ў вадзе крахмал (а крахмал знаходзіцца амаль ня ў кожным корме) на цукер, якога кроў жывёлы лёгка ўжо можа карыстаць.

Дзеля гэтага, шмат спаміж нашых гаспадароў робяць вялікую абмылку, даючы каровам праз лад дробны корм, вараны, або раз-

140519

баўлены вадой. На гэтакі корм карова менш выпушчае сьліны, чым на корм грубейшы і сушэйшы, а значыцца і ня ўсю можа выкарыстаць для сябе пажыву, якая знаходзіцца ў ім.

Перажованы і змочаны сьлінай корм—глытаецца і трапляе ў живот. Жылот каровы, як паказана тут на рысунку, складаецца з чатырох частак. Корм спачатку ідзе ў першы живот, які завецца рубец, або жвач, дзе—пры дапамозе сьліны, якая туды трапіла разам з кормам, і пры помачы досыць вялікага цяпла, якое трымаецца ў жвачы—часыць корму распушчаецца і ідзе, як паказана стрэлкай, проста ў сетку (чапец), а адтуль праз кніжку пападае ў праўдзівы живот (сычуг). А той корм, каторы зразу не распусціўся ў жвачы, вяртаецца назад у рот і тут нанова добра і акуратна перажоўваецца, а пасья ўжо ідзе проста праз сетку—ў кніжку, дзе як-бы наросты, бародавачкі яшчэ раз яго праціраюць і адбіраюць лішку вады і зусім ужо дробна перацёрты корм, быццам каша, трапляе ў сычуг, а там нераспушчаны бялок пры помачы мясцоных (з жывата) сокаў распушчаецца і усмоктываецца, а нераспушчаная тлустасьць—пры помачы жоўці, робіцца так сама прыдатнай і пажывунай для цела жывёлы. Гэта самае робіцца і ў тоўстай кішцы, а ўжо саўсім нераспушчаныя часткі корму выходзяць праз тонкіе кішкі калам.

Гэтакім парадкам мы бачым, што самае травеньне корму адбываецца ў сычугу, першыя тры часы жывата жывёлы толькі падгатаўляюць гэты корм, каб быў прыгодным для карыстанья з яго.

Кожны корм, як гэта пераканаліся навучна, складаецца: з бялку, амідаў, угляводаў, тлустасьці і дрэвасіны, значэньне якіх для арганізму жывёлы можна разьдзяліць на дзьве часткі: першая — гэта такія часткі, каторыя ідуць як матар'ял на карысьць і павялічэньне мяса, мускулаў і малака—гэта бялковыя часткі і крыху амідаў. Другая часыць корму, як угляводы і тлустасьць, а крыху дрэвасіны — складаюць матар'ял жывёле для тлустасьці і падтрымліванья цяпла ў цэле.

І вось, уся тут справа ў тым, каб у корме, які даецца карове, досыць хапала паводлуг яе тушы—вагі і паводлуг таго ліку малака, якое яна можа даць—усіх тых патрэбных частак.

З апісанья і рысунку жывата каровы, мы можам прыкмеціць, што ён куды хітрэй наладжаны для выкарыстанья пажывы з корму, чымсі, напрыклад, у каня, ці свіньні.

Навукай даказана, што карова на кожныя тысячу фунтаў жывой вагі павінна адтрымаць у корме: 260 грамаў бялковых частак, каб падтрымліваць сваё жыцьцё і апраца таго 135 грамаў на першы гарнец малака, або на рост цяляці ў нутры каровы; разам, значыцца, 395 грамаў бялковых частак. За кожную далейшую лішнюю кварту малака мы павінны даць карове 36 грамаў бялковых частак.

Што да крахмалу, тлустасьці і іншых частак харчоў, дык замест досыць труднага падлічваньня кожнай з гэтых лічбаў, мы будзем карыстаць так званым, эквівалентам (роўназначучым) крахмалу, ў якім узяты пад увагу ўсе гэтыя складныя часткі корму.

І так: мы павінны пільнаваць таго, каб у корме каровы для падтрыманья жыцьця яе на тысячу фунтаў жывой вагі было 7 фун-

тау (2,7 кілёграм.) эквіваленту крахмалу і апрача таго, каб даць першы гарнец малака—540 грамаў таго-ж эквіваленту. За кожную лішнюю кварту малака мы павінны дабаўляць 135 грамаў эквіваленту крахмалу.

Дэталыныя лікі бялковых і крахмальных частак, паводдуг вышэй сказаных нормаў—гэта і ёсьць падстава рацыянальнага і самага эканомнага корму жывёлы; бо толькі пры гэтых варунках, як бялковыя так і крахмальныя часткі будуць належна выкарыстаны і дадуць спадзяваныя рэзультаты.

Лішка якой-небудзь з гэтых частак ніколі не заменіць адна другой.

Намячаючы штодзённы корм для кароу, мала таго, каб толькі звачаць увагу на патрэбны лік спажывуемых частак, бо трэба яшчэ звярнуць увагу і на колькасць сухой масы (гэта ня значыць—сухога корму), балясту, сакавітасці, роўная мера корму, колькасць асобных кормаў, у якіх ёсьць фосфар, вапна, патрэбных таксама для жывёлы.

Сухая маса. Траўленьне у каровы пачынаецца тады толькі, калі запоўняцца кормам некаторыя часткі жывата яе. Практыка вучоных людзей паказала, што самы меншы лік сухой масы на 1000 фунтаў жывой вагі каровы, пры якой пачынаецца траўленьне — 15 фунтаў (6 кілёгр.); самае большае-ж не павінна пераходзіць 35 фунтаў сухой масы (14 кілёгр.) на 1000 фунтаў жывой вагі.

Баляст. Ня усю колькасць сухой масы корму—карова можа ператрапіць; некаторая частка яго—так званы баляст—застаецца нявыкарыстаным.


Трэба ведаць, што арганізм каровы прымае толькі частку балясту, колькі можа прыняць яе туша, а лішка яго толькі можа зашкодзіць карове.

Самая большая колькасць балясту не павінна быць больш 10 фунтаў, лічачы на 1000 фунтаў жывой вагі; значыцца—у больш малочных кароу, якім трэба большая колькасць кормаў, мы павінны падбіраць харч, які мае менш балясту.

Сакавітасць. Патрэбна звярнуць увагу у корме кароу яшчэ на тое, каб падчас зімовага кармленьня каровам хапала сакавітых харчоў (клубнёвых), бо сок іх вельмі добра спрыяе траўленьню і прыбаўляе малака.

Акуратны і сталы харч праз увесь год—гэта і ёсьць самая важная справа, калі мы хочам мець даход з каровы. Ніколі не павінна быць недахватаў у корме, а асабліва трэба звяртаць увагу на пераход з летняга на зімовае кармленьне і наадварот. Гэтыя пераходы—змены у корме заусёды найбольш адбіваюцца на колькасці малака у кароу.

А. Папроцкі.



Харчаваньне кароў пры даеньні.

Харчаваць кароў калі іх дояць ня можна. Калі карова есьць і доіцца пры гэтым разам, дык карова зьменшае удой, а той харч, што ужывае, не перажоўваецца як трэба.

Практыка паказала, што ў тых гаспадарках, дзе кароў пры даеньні кармілі, удой быў меншы, а як пачалі карміць кароў у другі час, то удой быў большы.

Кожны разумее, што гэта так, калі скажам, што найбольшая частка малака вырабляецца каровай пры самым даеньні ад прыліву крыві да вымя, а калі жывёла яшчэ і харчуецца разам з даеньнем, дык ёй прыліў крыві патрэбен і да галавы, дзе сьлініцца і жуецца харч.

Дзеля гэтага калі карова разам харчуецца і доіцца, дык вырабляецца менш малака, або дрэнна перажоўваецца і сьлініцца харч, што пасьля адзываецца на здароўі жывёлы.

Н. Б.

Гадуйце козы!

З хатніх жывёлаў бязуюна найкарысьнейша будзе каза, дзеля здаровага, тлустага і смачнага свайго малака і дзеля таго, што яна не вымагае ні асобных харчоў, ні дагляду. У бяскорміцу сьмела можам сказаць, што каза вытрывае харчуючыся аднымі бярозавымі венікамі; ды і так яна есьць мох, кару, лісьце, травы, якіх саўсім ня ужывае карова. У харч ей можна зімою прыбаўляць да 25% саломы, жывот яе добра варыць і салому.

У Швэйцарыі, дзе казаводзтва дайшло до найвысшага росквіту, вырахована, што на утрыманьне адной каровы можна харчаваць 8 козаў. А такі лік козаў дасьць куды значнейшую карысьць, як адна карова. Лічачы, што у сярэднім малочная каза у год дасьць 45 ведроў малака, а карова—150, будзем мець лішкі на адным малацэ каля 210 ведроў.

Апрача гэтага, замест аднаго цяляці якое прывядзе карова, ад 8 козаў будзе ня менш як 12 казянтаў, каштуючых куды болей як адно цяля.

Мясо казы ня горш кароўяга, а казянят куды смачней і каштуе даражэй, з скуры казянят і козаў вырабляюць найдалікатнейшую лайку ды сафьян. З шэрсці козаў робяць багатыя тканіны, вядомыя сваім гатункам з іх Орэнбургскіе хусты. Козі гной у гаспадарцы займае першае месца, бо расьліны на ём растуць надта добра.

Казінае малако самае здаровае для дзяцей. Ім сьмела можна карміць дзяцей-сасуноў, бо яно найбліжэй падходзіць да кабечага малака. Казінае малако здаровае тым, што козы амаль што саўсім не хварэюць на сухоты, тады як каровы часта хварэюць сухотамі. Для дзяцей да 3—4 гадоў найлепшым харчам будзе казінае малако, зьмешанае з аўсянай мукой.

З казінага малака робіцца вельмі смачны, дорага каштуючы сыр, робяць і масло, але яно горшае ад кароўяга.

З малочных козау найлепшымі лічацца швэйцарскіе белыя, з анненская, ці заанентальская; нямецкія — лангэн-зальцская (і тыя і другія камолье).

Ангорскіе козы даюць найдалікатнейшую шэрсць.

Т. Імшэнік.

Гадоўля кролікаў.

Як каза лічыцца кароўкай бедака, так зусім справядліва можам назваць кроліка—мясам бедака. І калі дагэтуль у нас мала зьвернена увагі на гадоўлю кролікаў, ці — як іх называюць—трусю, то на гэта складаецца дзье глаўныя прычыны: перш-на-перш няма ведама дзеля чаго шмат хто у нас брыдзіцца мясам кроліка, як брыдзіцца некаторыя ў Расіі мясам зайца, называючы яго дзікім катом. Другая прычына—яшчэ лепш нам знаная, старая: прывыклі мы брацца толькі за такую работу, каторую нашы суседзі за граніцай даўно ужо выпрабавалі на усялякія спосабы і шырока яе вядуць. Гэтак і з гадоўляй кролікаў.

У Францыі, напрыклад, гадоўля кролікаў вельмі распаўсюджана. У адной сталіцы Францыі—Парыжы расходзіцца кролічага мяса больш 50 тысячаў пудоў у год; прадаюць яго там і з гэтага гандлю ня мала людзей маюць добры заробтак, бо за адно мяса, ня лічачы скурак і адпадкаў, выгандэвуюць вялікія грошы.

У Бэльгіі ёсць фабрыка, у каторай вырабляюць скуркі кролікаў, дзе цэлы год працуе 2000 работнікаў. Колькі-ж такая фабрыка вырабляе скурак гэтых праз адзін толькі год?

А трэба ведаць, што з забітага кроліка нічога дарма не прападае: зімовыя скуркі яго за граніцай стрыгуць і фарбуюць пад колер дарагіх зьвяркоў, як куніц, баброў, харкоў, і г. д. і гэтак сфальшаваныя прадаюць за дарагія цэны ў Расію; волас з летніх скурак кролікаў ідзе на фільцовыя капялюшы, рукавічкі, а самая скурка, як і цялячая—на далікатныя боцікі і інш.; кішкі кролікаў ідуць на струны; вушы і лапкі—на клей; трыбухамі кормяць свіней — словам — з усяго карысць і даход.

Само-ж мяса кроліка чыстае і здаровае і, як паказала навуковая проба—аналіз, вельмі страўнае і пажывнае, бо мае у сабе больш бялковых частак, чымсі якое іншае, ужыванае ў нас, мяса:

свініна мае ў сабе бялк. част.	16%
ялавічына „ „ „ „	20%
кролічае мяса „ „ „ „	25%

У Англіі і Францыі хворым у шпіталях даюць, як больш далікатнае і прыгоднае, мяса кролікаў.

У Нямецчыне ёсць спецыяльныя крамы, дзе прадаюць мяса толькі кролікаў. Насколько цікавіцца немцы справай гадоўлі кролікаў, відаць ужо з таго, што там друкуецца і расходзіцца дзесяць розных газэт, каторыя пішуць толькі аб кроліках.

З усяго гэтага мы бачым, як паважна займаюцца ўсе культурныя гаспадарствы гадоўляй кролікаў; на гэту справу глядзяць яны, як на новую даходную стацьцю, каторая можа прыспоруць багацьця для роднага краю. Пара і нам зьвярнуць увагу на гадоўлю кролікаў; пара тым больш, што гэты новы для нас даход можна мець пры найменшай і найбяднейшай нават гаспадарцы і не вымагае ні такога вялікага ўжо клопату, ні такога вялікага накладу.

Само сабой разумеецца, што меншы, ці большы даход з гадоўлі кролікаў будзе залежаць ад таго накладу і даходу, якіе мы да гэтага даложым.

Для прыкладу успомню тут аб адным селяніне з вёскі Малой Сямёнаўкі, Балашоўскага павету, аб каторым ёсьць апісаньне у № 2 „Хлібароба“ 1914 г.

Купіў гэты селянін адну пару кролікаў за 25 к., а другую—за 15 к. Паміж імі быў адзін самец і тры саміцы. Кролікаў пусьціў ён у адрыну, дзе было зложана сено. У лютым месяцы саміцы прывялі 21 штуку маладых; такі самы прыплод быў у марцы і ў канцы красавіка. Да серпня кролікаў было ўжо 120 штук, а ў лістападзе набралася іх 300 штук. Тады самцоў адсадзілі асобна. Калі зарэзалі першага труса, то сямейка гаспадары не магла адважыцца яго есьці, але ў скорасьці прывыклі да мяса кролікаў ня толькі самі, але і суседзі. 200 штук кролікаў зарэзалі на мяса, а даход быў такі: 50 пар прадалі жывых па 50 к. за пару—25 руб.; 2 фунты пуху кролічага па 3 рублі за фунт—6 р.; 180 скурак па 25 к.—45 р.; 20 скурак, вырабленых самім гаспадаром, па 50 к.—10 р.; мяса 12 пуд. 20 фунт. па 10 к. за фунт.—50 р., а за усе, значыцца, 136 руб. Калі-ж адлічыць кошт корму кролікаў па 25 к. на штуку—75 рубл., то чыстага даходу застанецца 61 руб.

Гэткі даход, як бачым, адтрымаў гаспадар бяз ніякага, можна сказаць, накладу і рызыкі, пры саўсім малым расходзе. Саўсім іншая справа, калі хто захоча заняцца спэцыяльна гадоўляй кролікаў і мець з гэтага і сапраўды добрую грашавую падмогу пры сваёй хоць і невяліччай гаспадарцы: тут прыдзецца ўжо зрабіць і крыху накладу грашымі і прылажыць больш сваёй працы.

Хто маніцца заняцца гадоўляй кролікаў, каб мець з гэтага як найбольшы даход, павінен перш на перш лічыцца з мясцовымі варункамі, зважаючы на тое, з чаго на месцы можна мець лепшую карысьць: з мяса, ці са скурак і пуху кроліка; бо трэба ведаць, што гатункаў тусоў ёсьць шмат і адны спаміж іх даюць больш мяса, але скуркі іх менш цэняцца; іншыя зноў кролікі хоць самі важаць і нямнога, але іх пух дарагі.

Дык разгледзім некаторыя, больш падхадзячыя для нашых варункаў, гатункі кролікаў.

Кролікі на мяса. Спаміж гатункаў тусоў, каторыя найбольш прыгодны на мяса—гэта Летарынгскі і Фляндрскі.

Летарынгскі кролік важыць 12–15 фунтаў; ён не пераборлівы на яду і вельмі вытрывалы на усялякую пагоду, дзеля гэтага Летарынгскі кролік падходзіць да нашых кліматычных варункаў.

Фляндскі кролік мае вагі 13—15 фунтаў, а трапляюцца некаторыя штукі і па поўпуда. Мясо іх вельмі смачное, ня уступіць найлепшай цяляціне, а выкормліваюцца надта скоро. Кролікі гэтага гатунку спакойныя, характару ласкавага і не пераборлівыя ў ядзе. Скуркі іх маюць так сама добры збыт. За граніцай пара такіх кролікаў цэніцца 6—8 рублёў.

Дык вось гэтыя два гатункі кролікаў, як Лётарынгскі і Фляндскі і трэба прызнаць, найбольш прыгоднымі для гадоўлі у нашым краі на мяса. Але, пакуль што, як ведама, ў нас людзі саўсім яшчэ мала прывыкшы да кролічага мяса, дык гадуючы мясных гатункаў кролікаў у большай колькасці, можа быць тая рызыка, што ня будзе куды зываць іх мяса. Дзеля гэтага,—у нас, бадай, пэўнейшы рахунак і менш рызыкі заняцца гадоўляй кролікаў, даход з каторых самы важны бывае не з мяса, а з іх пуху і скурак. Тым больш варта гэтым заняцца, што збыт на кролічы пух заўсёды забяспечаны, бо ён ідзе на розныя далікатныя вырабы ня толькі у нас, але і за граніцай і цана на яго заўсёды трымаецца высокая. Скуркі-ж кролікаў так сама, што раз больш і больш расходзяцца, дык і за іх цану плацяць добрую. Ды гэта саўсім і зразумела. Лясы нашы растуць як сьнег; з кожным годам колькасць зьвяркоў з цёплымі скуркамі што раз змяншаецца; на бедную вавёрку—абы асачылі—чуць не аблавай ідуць людзі,—вось і прыходзіцца штукавацца ня толькі лепшымі, кролічымі, але нават добра падтрэпанымі зайчымі.

А. Вілецкі.



Якую ляпей рабіць падсьцілку.

Моц у гнаі ня бывае роўная, гэта добра ведае кожны гаспадар. Кожная жывёла дае інакшы гной. Моц у гнаі ня столькі залежыць ад самой жывёлы, колькі ад гатунку харчоў і ад гатунку падсьцілкі.

Вучоныя гаспадары, каб пазнаць які гной найлепш, рабілі з ім усялякія пробы і праканаліся вось на чым.

Калі рабіць падсьцілку з адной саломы, хоць класьці яе шкадуючы, гэтка гной найкарысьней вывозіць на поле сьвежым, не чакаючы пакуль ён у хлеме саўсім перагніе. Вывозіць яго трэба на поле дзе-б ён мог завораны ляжаць у зямлі як найдаўжэйшы час, і там—на месцы—ў зямлі ужо павінен перагніваць. З гэтага відаць, што сьвежы гной найляпей вывозіць у поле на зіму і прыворваць яго, альбо з вясны на папар, каб ён меў добры час перагніць у зямлі.

Калі-ж саламяны гной павінен ляжаць праз доўгі час у хлеме і там перагніваць, каб ён ня траціў сваей моцы, трэба, канешне, даваць яшчэ інакшай падсьцілкі, альбо прасушанага торфу, ці лясной падсьцілкі, мох з лісьцем разам, альбо купік з сенажацияў, ці хоць зямлі з равоў, каўдобін і інш. Зямля, як і торф уцягвае ў сябе гнаявую жыжку і ад гэтага робіцца гной крапчэйшы і карысьнейшы.

У саламяным гнаі узгадоваваюцца жыўчыкі, так званыя бактэрыі, якіе харчуюцца і зніштожаваюць у ім тое (салетра), што найкарысьнейшае для прыбытку зерняці.

У конскім гнаі большая моца ў мачы, чым у самым кале; але гэтая моц мачы гіне, калі рабіць у стайні падсьцілку з адной толькі саломы; трэба хоць пакрысе штодня пацярушыць зямлёй ці торфам,—усё багацьце гною застаецца ў гэткай падсьцілцы тады толькі можа быць давезены бяз страты на поле.

Пераканацца ў гэтым лёгка можа кожны гаспадар.

Пасьля ночы калі адчынiш стайню адтуль б'е дух, гэты дух, што так дае ў нос і ёсьць самая моц конскага гною—яго мачы (амьяк), які вытыхае і, значыцца, дарма гніе. Падсыпаўшы з вечара зямлі ў стаўню, а назаўтра гэтага духу ані званьня, бо зямля ўсю мачу уцягвае у сябе і толькі ўжо на полі пасеяныя зёрны выкарыстаюць патрэбныя харчы з гэтай моцы.

Якая моц і якая карысьць з конскай мачы можна пераканацца з тых густых, цёмных буйных кустоў збажыны, якіе ўзрастаюць на полі на тым месцы, дзе, ў часе воркі, вымачыўся конь.


Вось яшчэ адна важная справа і парада.

Узіму, калі час вільготны, ды і ў будынку бывае цесна з гноем, прыходзіцца яго вывозіць на поле.

Як-жа яго там складаць так, каб найменш было глуму. Раскідаюць гной у маленькія кучкі. Гэта-ж глум—страшэнны глум!

Вывозячы гной зімою трэба яго, калі ёсьць магчымасьць (невялікі сьнег) усьлед раскінуць роўненька жалезнымі віламі па полі, або складаць у вялізарныя кучы, перакладаючы яго зямлей, торфам, сьнегам у сярэдзіне і так сама прыкрываючы зверху.

Г—р.



Распрацоўка ялавiн на гліста-вільготных і балацяных глебах.

Кожнаму гаспадару вядома, што калі якую доўгатэрмінную ялавiну выпрацаваць пад ніву, то яна у цягу многіх гадоў бяз ніякага ўгнаеньня даець досі значныя ўроды.

Вядома, што гэта ўроднасьць ялавiны залежыць ад запасься у глебе яе за час муражына, лесу ці iншага становiшча перагнаю. Перагнай ялавiны заўсёды ў сваім складзе маець частку такога, які хутка разгнівацца і пад уплывам квасоў і соляў глебы пераходзіць у харчовыя стравы, мажлівыя дасягу расьлін. Па разробе ялавiны варункі разгнаеньня перагнаю досі зьмяншаюцца, мажлівы гнаіцца перагнай хутка пераходзіць ў харчавыя стравы, даець іх многа і гэтым запўняець у першыя гады па распрацоўцы ялавiны вялікія ўроды.

Гэтак-жа у запасьсі ялавiны ёсьць такі перагнай, які разгніваецца дужа цяжка і даець штогодна невялікі лік харчавых страў. Але як

у ялавіне за доўгі тэрмін запасіцца многа такога перагною, дык ён хоць разгніваючыся і памалу даець харчавых страў у дастатку пасярэдніе уроды, якіе і трымаюцца у цягу доўгага часу, пасля першых па разробе вялікіх уродаў.

Мне-ж часта прыходзілася чуць скаргу сялян, што распрацованая доўгатэрмінная ялавіна ня толькі не дала якую-колечы ўроду, але чуць зьвярнула насенне. Пры чым дрэнныя варункі надвор'я, вырабу шкадлівай жыўнасьці і інш. не маглі там мець месца і ў той самы год, старапольлі далі добрыя уроды гэі самай збажыны.

Тлумачыцца гэта тым, што няўроды незалежны ад іншых варункаў, апрача глебных, ў першыя гады распрацоўкі ялавіны, здарліся на вільготна-глістых і балацяных глебах, глебах багатых перагноем, але дужа к в а с н ы х, што і было грашковай добрай выгадоўлі расьлін.

Кваснасьць глебы асабліва шкадліва на ўзыходзячую збажыну, зачым яна ўзрастае рэдкай. Вось гэта кваснасьць глебы і ёсьць прашкадовай вялікіх уродаў у першыя гады распрацоўкі ялавін, пакуль гэта кваснасьць не ўсярэдніцца сама па сабе, на што патрэбен час некалькіх гадоў.

За гэтым карысна якім-небудзь парадкам ўсярэдніць кваснасьць глебы ў пачатку распрацоўкі ялавіны, што і дасягаецца в а п н а в а н ь н я м і гэтых глеб.

Аб вапнаваньні глеб будзе гаворана ў чарговым нумары.

Аграном М. Г—к

С а р а д э л я .

Як лубін, так і сарадэля можа расьці і на дрэннай зямлі, на ялавінах.

Расьце сарадэля найлепш на лёгкай зямлі, дзе мала вавны, на макраватых кусках, але ня любіць калі падысцадам блізка вада ёсьць.

Сарадэлю гэтак сама, як лубін, добра завошаваць на зялёны гной, яна напраўляе зямлю.

Аднак лепей яе скарміць перш скацінай, а пасля вывезьці гэты гной, бо корм з сарадэлі надта добры, скаціна будзе тлустая і гною шмат, каровы вельмі ласа ядуць сарадэлю на зялёны корм. Ад яе каровы даюць шмат малака і сарадэля не раздувае кароў, як канюшына, дзеля гэтага можна яе даваць уволю есьці каровам.

Сеяць трэба сарадэлю, як і кожную ярыну—вясной. Высяваць на дзесяціну каля 2 пудоў ($1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ пуд.). А дзеля таго, што зерняткі сарадэлі маленькіе, дык забарановаваць яе трэба вельмі лёгка, на якіх чверць або поўцалі.

Поле пад сарадэлю трэба вырабляць і ачышчаць ад зеляна, дзеля таго, што яна спачатку расьце вельмі марудна. Сьвірэшціцу, асот трэба касіць паверх сарадэлі, каб ня глумілі яе. Найлепш разрастаецца сарадэля, як ужо пачынаецца жніво. Калі на пачатку сарадэля падымаецца

марудна, ня трэба думаць, што яна прапала. Трэба толькі пільнаваць, каб зельле яе ня глушыло. Дзеля гэтага найлепш сарадэлю сеяць па жыце, ад раньняй вясны, аж да часу калі яно пачынае красаваць, бо жыто яе ня глуміць, у жыці няма зельля. Як пажнецца жыто, сарадэлі пачынае разрастацца, а увосень яе можна скасіць на сухі корм, або епасьвіць на полі скацінаю.


На сухі корм найлепш сарадэлю касіць тады, калі яна красуе, бо гэта можа зацягнуцца аж да прымаразкаў. Калі будзем касіць сарадэлю, як яна ужо з два тыдні красавала, дык будзем мець добры харч і насеньне.

Скасіўшы сарадэлю, сушыць яе трэба ў кошнях як і канюшыну, але дзеля таго, што яна вельмі далікатная, ня трэба часта варочаць, каб не абтрусіць лісточкаў і струкоў.

Калі малоцяць сарадэлю, дык абсыпаецца шмат лісьцейкаў, гэтымі лісьцейкамі карысна харчаваць свіней, а сьцяблы можна даваць ка ровам і коням.

Насеньня сарадэлі зьбіраецца з дзясняціны ад 10 да 50 пудоу. Сена з сарадэлі зьбіраецца каля 100—200 пудоу з дзясняціны, а зялёнага нясушэнага харчу—600—1000 пудоў з дзясняціны.

Л. С—ні.



Нехваткі трохполья.

Агульнай сыстэмай сельскай гаспадаркі Беларусі есьць пастарэўнае трохполье, толькі маёнтныя гаспадаркі маюць у нас многапольныя формы паляводства, што павінна легчы і ў грунт вясковай гаспадарнасьці.

У трохпольлі ўсё воранае поле дзеліцца на тры кліны, пладазьмен іх гэтакі: 1) азім, 2) ярына, 3) папар, пры чым пашай абслуговуе, за выключэньнем гаспадарак, маючых збочныя натурныя палы, зьмена папару, адсюль: 1) заворыво яго ўпару ніколі немагчыма, а гаварыць аб канешным яго ворыве з восені ці вясны, ня прыходіцца. Заворываць папар у такіх гаспадарках магчыма толькі у касьбу, ці жніво, як даецца скаціне іншая паша, і гэткае познее ворыво з далейшым вырабам папару перш за ўсё сказуецца на уродзе. 2) Паша голага папару ня можа даць патрэбнага харчаваньня скаціне гаспадаркі, прадукцыйнасьць якой зьменшуецца на многа, што балюча адзываецца на усей гаспадарцы і асабліва на паляводстве. 3) Паша скаціны на папару убіваець яго, што з далейшым яго вырабам (нечасовае ворыво і інш.) стварае зьбітасьць і зьменшае пухнасьць, а гэта мае вялікі ўплыў на запашэньне харчавых страў і на магчымасьць здэжываць вільгаць.

Нечасовы выраб, кенская пухнасьць глебы, бязсыстэмнасьць пладазьмену (пры трохпольлі сыстэміруецца, толькі азіма ды ярына, а віды—апошняя у сваім полі гадуецца бяз усякай сыстэмнасьці)

саадаець варункі лепшае ўзгадоўлі непатрэбных дзікіх расьлін, чымей гаспадарскіх.

Дзікія расьліны апрача сваей шкадлівасьці, ў сваю чаргу даюць магчымасьць лепшай ўзгадоўлі, шкадлівай жыўнасьці і паразытных расьлінаў.

Гадуючы гаспадарскіе і др. расьліны, глеба траціць харчоўнасьць, згоршуе сваю пульхнасьць і дзеля зьменшаньня гэтага павінна час ад часу мець аддуху, калі адтрымаўшы угнаенне і добры выраб, зноў стане прыгоднай дзеля выгадоўлі расьліны.

Такую аддуху поле адтрымовуе ў час папару.

У трохпольлі, як мы бачым поле адпачывае праз 2 гады, але такое становішчо папару, якое мы тут бачым у трохпольлі, ня можа звацца аддухай, зачым варункі перагнаення і запасься харчавых страў ня могуць мець месца ў дастатку пры трохпольлі, што зноў сказуецца на ўродах.

Пакінутая штогод $\frac{1}{3}$ ворыва пад папарам, зьменшае значна прадукцыйнасьць гаспадаркі, а згоршаньне глебы хімічна і мэханічна відзе гэту прадукцыйнасьць па шыбкаму спуску ўніз.

	1 пол.	2 п.	3 п.
1 год	папар	азім	ярына
2 год	азім	ярына	папар
3 год	ярына	папар	азім

Схэма трохпольля.

Аграном М. Г-н.

Дагляд табакі.

I.

Як трэба палоць і абкопваць табаку.

Найбольшая карысьць для табакі у пільнаваньні каб не расло ніякай нягоднай травы і каб грунт быў пульхны. Калі няма нягоднай травы, раскашней ідзе разьвіцьце лісьцяў табакі і хутчэй пачынае красавацца; так сама, дзеля гэтага, абкопваюць табаку і дзеля таго, каб мацней трымалася у зямлі галіна і каб ад ветру не паламалася, абкопываць трэба ня вышэй як на $\frac{1}{2}$ —1 вярш. увышыню і трэба берагчыся каб не загарнуць зямлёй першых сподніх далікатных лісьцейкаў.

Так як у нас нядоўгае лета і восень вільготная, то трэба сьпяшацца, каб табакі пасьпела і высахла ў пару; дзеля гэтага ня мож на болей аднаго разу, абкопваць.

II.

Жк трэба зрэзваць цвѣт і бакавыя галіны.

Як пачынае цвѣсьці табака — гэта самая найважнейшая для табака пара. У гэтую пару тым ці іншым спосабам, можна павялічыць ураджай лісьцяў.

А гэта робіцца пры помачы спосабаў: рэзаньня цвѣточных верхавінак і бакавых галінак і тых што ідуць з карэньняў (пасынкаваньня).

Калі мы у табака зрэжам верхавінку, праз некалькі дзён убачым, што ў мясцох, дзе расьце лісьцё каля самай галіны (лісьцявые пазухі) пачнуць вырастаць галінкі, гэтыя галінкі завуцца пасынкамі, а калі іх абрэзваць — завецца пасынкаваньнем.

Карэньявыя галіны зараз-жа з'яўляюцца як толькі абрэжуць бакавыя галіны, іх трэба, абавязкова, хутчэй зрэзаць яны шкадлівы для ўсей табака.

Ад абрэзаньня (пасынкаваньня), як вышэй напісана, робіцца гатунак табака лепшым, бо ад гэтага залежыць узрост лісьцяў, таўшчыня іх, моц табака і інш. Цвѣточныя верхавінкі і бакавыя галінкі зрэзваюць ў розную пару, гледзячы на тое, якой моцы патрэбна табака.

Калі патрэбна моцная табака, дык абавязкова трэба абрэзаць цвѣточную пупушку як толькі яна вылезець і разам з ёй ад 4 да 6 маленькіх лісьцейкаў. Апрача таго трэба пільнаваць і абрэзваць бакавыя галінкі (пасынкі) калі яны вырастуць ў $\frac{1}{2}$ верш. ў даўж.

Моцная табака эвычайна удаецца на моцных тлустых грунтах.

Калі хочуць, каб табака была сярэдняй моцы, дык тады цвѣт трэба зрэзаць у тую пару, калі ён добра закрасуецца, або ужо ў канец красаваньня.

Пры гэтым трэба абрэзаць 3—5 верхніх лісьцейкаў. Бакавыя галіны, у гэтакім выпадку абрэзваць калі вырастуць у даўж. ў 2 вяршкі.

На зямлі сярэдняй уроднасьці, асабліва, калі у ёй ёсьць процэнт пяску, выходзе найлепшая табака. Хаця ураджай будзе меншы, але колер і пах дыму будзе шмат лепшы, чымсі на надта тлустым і цяжкім грунце. Калі мы адрэжам красачныя пучкі, калі яны распукнуліся толькі напалову і адначасова зрэзалі некалькі верхніх лісьцейкаў, а бакавыя галінкі абрэзаць як толькі яны дарастуць да 1—1 $\frac{1}{2}$ вяр; гэта будзе табака сярэдняй моцы.

Дзеля таго каб мець табаку лёгкую на такім-жа грунце, красак мажліва ня зрэзваць саўсім, ці зрэзваць разам з 2—3 лісьцейкамі ў момэнт іх поўнага красаваньня.

На бедных грунтах выходзе толькі лёгкая табака (ня моцная), якая хаця і будзе добрага гатунку, але ўроды дасьць меней, чымсі у тых выпадках, якіе вышэй гавораны. На лёгкім грунце верхавінкі табака абрэзваюцца як толькі зьявіцца красачная пучка; разам з ёю абрэзваюцца 2—3 верхніх лісьцейкі. Бакавыя-ж галіны зрэзваюцца калі вырастуць у $\frac{1}{2}$ вяршка.

Ня гледзячы на вышэй напісаные тлумачэньні (правілы), немагчыма сказаць якая табака вырасьце: сярэдняя, ці вышэй-сярдняе; сярэдняя ці слабая.

Трэба мець вялікую практыку, добра ведаць грунт, якая бывае пагода і інш.

Трэба памятаваць яшчэ тое, што на адной галіне табакі розныя лісьця маюць розную моц.

Самыя ніжэйшыя 2—3 лісты найслабейшыя, сярэдніе—мацней—ніжэй сярэдніх і верхніе—наймацнейшыя.

Аграном В. Ш.



Штучнае раеньне пчол.

Па першай вясновай чынасьці, калі пасека давядзецца да добрага стану праз спэкуляцыйнае харчаваньне, лужэньне слабых і бяз матак, цяпер прышла пара засяленьня слабеішых праз даваньне крытае чэрвы і маладых пчол.

Робіцца гэта вась як: у ціхі пагодны і цёплы дзень, калі пчолы будуць на палёце, бярэцца у ройніцу ад дужа моцнай сямі ад 1—2 рамакі з крытаю чэрваю, паабмятаўшы добра маладых пчол з гэтых рамак і дадаецца да слабых. Пры гэтай чынасьці трэба уважаць добра, каб не забраць маткі з вульля, з якога бярэцца чэрва і маладых пчолаў.

Мэта пчаляра дваякая: павялічыць пасеку, або выкарыстаць на мёд.

Павялічыць пасеку можна гэтак: дапушчаць да натуральнай ройкі пчаляру ня выгадна, бо трэба пільнаваць пчол ад гадзіны 8 з рана да 4 ўдзень, пчолы перад ройкай кепска працуюць, частка іх разлётуюцца іскам, шукаючы сабе новай сядзібы, а рэшта вісяць ланцужком у вульлі. Трэба запабягаць гэтаму і рабіць раі штучныя. Штучныя раі робяцца гэтак: у цёплы і ціхі дзень, калі ўсе старыя пчолы на палёце, трэба выбраць наймацнейшы вулей, запоунены ад 14 да 16 рамак, прыготовываецца парожні вулей і становіцца на месце моцнага, а моцны адносіцца трохі ў бок і з моцнага вульля палавіну рамак пераносіцца ў парожні, але трэба абавязкова з гэтых рамак абмесці маладых пчол, і дадаецца старая матка, тады да яе зьяцяцца з палётку старыя пчолы і выраі гатоў. Старый вулей з маладымі пчоламі і крытаю чэрваю аднесці на крокаў 40 на новае месце; даць, калі есьць, запасную матку або крыты матачнік, а калі іх няма, дык самі заложыць з някрытае чэрвы.

Другім спосабам павялічэньне робіцца гэтак: з некалькіх вульлёў у ройніцу наабмятаць маладых пчолаў і адбіраць з крытай чэрвай рамак 4—6 і ўсе гэта пасаціць у новы вулей і так сама матку, або крыты матачнік, а калі іх няма, самі заложыць матачнік. Як у адным, так і ў другім разе бяручы крытую чэрву, ці абмятаючы маладыя пчолы трэба прыглядацца, каб не забраць маткі, а устанаўляючы

гняздо краявыя рамкі, каб былі бяз чэрвы і каб гняздо было пакрыта пчоламі, гэта значыць, каб чэрва абсядалася і не зазябла, а калі-б тае было замала, то дадаць маладых пчол з другіх вульлёў.

Пакуль маладыя зробленыя раі стануць лятаць у поле, трэба на вылёты класыці значыўшы губку ці шкумацінку ў вадзе крыху падсоленай, ім гэта патрэбна для чэрвы і свайго прагненьня, бо мёд і пылок у вульлі маюць, а вады ня маюць. Потым, праз 2—3 нядзелі трэба праканацца, ці шчасліва запладзіліся маладыя маткі—ці кладуць яечкі.

В. Русеці.

Хто хоча зрабіць якія запытаньні па пчалярству ці аглядзець паказную пасеку ў Менску, хай зьвернецца ў рэдакцыю.

В. Р.

Як усьцерагчы гусянят каб ня дохлі.

Часта бываець, што ў гарачае лето гусяняты падыхаюць.

Як толькі захварэе гусянё, то яно апускае крыльля, ходзіць як п'яное, неахвотна шчыпле траву, пішчыць жаласным голасам, лапы і дзёуб бялюць, адстае ад стада і праз колькі дзён падыхае. Чым гарачэйшае лето, тым больш падыхае гусянят.

Ведама, што гусей на-нач заганяюць у маленькі хлявок, дзе яны ўночы выпаражніваюцца.

Але трэба ведаць, што гуска на тым месцы, дзе спаражнілася ня сядзе, а шукае сьвежага чыстага месца. Знача сама прырода іх паказвае ім, як берагчыся ад хваробы.

За колькі дзён, у гарачыню, у хлеме, у гусячым гнаі разгадуюцца жывучкі (мікробы) і заражаюць увесь хлеў.

Каб усьцерагчы гусей ад хваробы, канечне, трэба кожны дзень гусячы гной пасыпаць нягашанай вапнай, або сухім торфам, паверх гэтага наслаць саломы, якую прысыпаць зямлей; сьцены ў хлеме трэба тры разы ў тыдзень бяліць вапнай, або змываць карболовым квасам, а лепш за усё гусей на-нач пакідаць на дварэ і кожны дзень выгнаўшы на пашу, гной зграбсьці ў хлеў і засыпаць яго там зямлёй, а раз у тыдзень надворак, дзе начуюць гусі, пасыпаць вапнай, або торфам.

Калі-ж пры гэтым які гусёнак захварэе, дык яго, канешне, трэба адлучыць ад здаровых

Калі рабіць гэтак, як тут казанэ, то гусяняты, напэўна, падыхаць ня будуць і набярэцца некалькі вазоў надта добрага гною.

Практычны гаспадар.



Мураўіныя яйкі як покарм для куранят.

Каб кураняты выгадаваліся моцнымі ды здаровымі трэба іх карміць найлепшым покармам. Можна мала хто знае, што мураўіныя яйкі якраз і з'яўляюцца гэтым найлепшым покармам.

Гэта самы любімы і ласы покарм для куранят, яны іх ядуць з вялікай заіздрасцю і могуць з'есці шмат, не псуучы сабе жыватоў. Мураўіныя яйкі—гэта, так званы, жывотны покарм, і кураняты ад яго вельмі хутка папраўляюцца, растуць хутка, а хворыя дык здаравеюць.

Некаторыя з кураведаў кажуць, што выгадаваныя на мураўіных яйках курачкі, будуць найлепей нясыця.

Трэба толькі ведаць як здабыць гэтыя мураўіныя яйкі. Канец мая ды чэрвеня—найлепшая пара здабычы іх. У нас, на бацькушчыне шмат лясоў, а у іх мы заўсёды бачым вялікія мураўіныя кучы.

Дык вось рыдлёўкаю разрыем такую кучу, бярам з сярэдзіны усё што пападае і кладзем у торбу. Выносім на чыстае месца, дзе няма травы і дзе шмат сонца. Там робім няглыбокія ямачкі, якія прыкрыем хваёвымі, ці сасновымі галінкамі. Сярод ямчак і высыпем усё сьмецьцё. Мурашкі па інстынкту ведаюць, што ад сонца яйкі хутка сапсуюцца і вельмі борзда пачнуць зносіць іх у ямачкі, заслоненыя галінкамі. Тады латва пазьбіраць гэтыя яйкі.

Т. Імшэнік.

Паліўка саду.

Ня можна дапушчаць, каб зямля ў садзе перасыхала, бо гэта шкадліва адзавецца на завязях (пачнуць абсыпацца)!.

Калі стаіць гарачыня і няма дажджоў, трэба, канечне, на колькі ёсць мажлівасць, паліваць дрэвы. На адно дрэво, глядзячы на ўзрост, 5—10 вёдраў вады.

Ігнатвіч.

Аб карысьці розных дрэваў.

Дрэваў у нас шмат, але што за карысьць што панасадзяць бяз толку таполі, ліпы, бярозы і інш. Месца займае, а карысьці не дае!

Вось, напрыклад, у Нямецчыне: ні адной крыхі зямлі без карысьці ня згіне, ніводнага дрэўца без карысьці і разуменьня не пасадыць. Трэба і нам карыстаць са ўсяго, тады толькі наша гаспадарка пойдзе угару.

Садзеце прысады, садзеце каля хаты дрэвы, карысныя гаспадарцы. Садзеце дзікія грушы, яблыны, садзеце каштаны, дубы—будзеце мець пекныя дрэвы і ўвосень харч для жывёлы.

Надта ахвотна ядуць дзічкі сьвіньні, а яшчэ ахватней каштаны, жалуды і сыцеюць ад іх ляпей, як ад жалудоў, бо у каштанах ёсць надта карысныя харчовыя часткі.

Ст-сная.

Заразные хваробы свіней.

Усім вядома як лёгка гінуць свіньні ад розных заразных хваробаў, вельмі падобных адна да другога, дзеля чаго па несъвядомасьці ўсе гэтыя хваробы завуць „рожаю“, але ўзапраўды аказваецца, што у свіней ёсьць тры найбольш глаўныя заразные хваробы, адменныя адна ад другой і кожная з іх патрабуе асобных мэтодаў па-ратунку.

Гэтыя тры хваробы гэтакіе: 1) Павальная хвароба свіней (сэптыцэмія), 2) Чума, 3) Рожа (чырвонка).

Павальная хвароба. Глаўнымі адзнакамі гэтай хваробы: сухі кароткі кашаль, дыхаюць цяжка, хрыпла, часамі з носа ідзе сьлізь, перастае есьці, зарываецца ў падсьцілку, на вушох, шыі, бакох з'яўляюцца чырвоныя плямы, якія ня гінуць, калі прыцісьнем іх пальцам. Спачатку хваробы бывае запор, а ў канцы з'яўляецца вольнасьць з кроўю. Хвароба бывае ў працягу ад 1—2 дзён, а ў некаторых да 6 тыдняў. Найбольш гэтай хваробай хварэюць маладыя свіньні.

Чума. Гэтай хваробай часьцей хварэюць маладыя свіньні да 4-х месяцаў. Глаўнейшымі адзнакамі хваробы: траціць апэтыт, убываецца ў вугал свінарніка, частыя ваніты жоўтай сьліззю, ў роце чырванее, язык робіцца афарбоўкі брудна-шэрай, свіньня выгінаецца ўверх, на вушох і жываце з'яўляюцца чырвоныя плямы, ходзячы хістаецца і дохнецць праз 3—8 дзён.

Рожа—гэта хвароба часьцей бывае ўлетку, ў цесных, вільготных і брудных хлявах. Хварэюць часьцей у ўзросьце ад 3 да 12 месяцаў, радзей у 3-х гадовым ўзросьце, а яшчэ радзей—у старым.

Перадаецца рожа здаровым ад хворых і ад таго месца, дзе засталіся сьляды хворых; праз паветро зараза не пераносіцца.

Адзнакі хваробы гэтакіе: хвора свіньня ня есьць, ляжыць, бывае паралюш заду, векі на вачох успухаюць, бялок вока чырванее, скрыгоча зубамі і інш. Часьцей усяго на другі дзень хваробы на вушох, шыі, грудзях і ўнізе жывата з'яўляюцца сьветла-чырвоныя, а потым цямнейшыя плямы, а плямы на вушох пакрываюцца пупыркамі, лякса бывае часамі з кроўю. Слабасць павялічваецца і на 5 дзень здыхае.

Агульнае лячэньне.

Лячэньне лякарствамі гэтых хваробаў немаль што не даець ніякай карысьці.

Даюць у пачатку хваробы каламель 2—3 грамы на адзін раз.

Найляпей папераджаць хваробы у свіней шчапёнкамі (прывіўкамі); ад кожнага хваробы асобная. Шчапёнкамі распараджаецца і робіць вэтэрынар, як ён прызнае тую ці іншую хваробу, але і сам гаспадар павінен сцерагчыся занесьці заразу да сябе, дзеля гэтага трэба з асьцярогай адносіцца купляючы: першыя 2—3 тыдні трымаць купленых свіней асобна і калі будзе відаць, што яны саўсім здаровы, можна далучыць да сваіх.

Купляючы трэба сцерагчыся кашлю ўсялякага і інш. адзнакаў хваробы. Свіньня—адна з самых далікатных жывёлаў. Гаспадар паві-

нен трымаць яё у чыстаце, сусе, часьцей мыць пасуду, у якой яна есьць, зьменяваць падсьцілку, а калі есьць магчымасьць—мыць. За тое што не даюць чыстаты і трымаюць сьвіней у недаглядзе, часта хварэюць ідохнуць і гіне агульная гаспадарка вёсак і усяго краю.

Амэрыка, Англія і інш. народы зразумелі значэньне сьвіней у агульнай гаспадарцы, адносяцца з вялікай увагаю да гэтае жывёлы, ад чаго маюць вялікую карысьць.

Пара і нам ужо ўзяцца належным чынам за гэтую справу, каб мець ня меншую карысьць, якую маюць людзі.

Доктар-Вэтэрынар І. Серада.

Косьці.

За апошнюю вайну, край наш знішчожаў з'явіліся цяжкіе варункі жыцця і прамысловасьці, якіе ледзь толькі варухаюцца пасля разбураньня.

Дзеля таго што стварылося гэтае становішча мы павінны больш за усё звяртаць увагу на тые натуральныя багацьці, якіе ёсьць ў нас на месцы і на якіе мы да гэтага часу не звярталі ўвагі.

Усё тое, што мы завём смецьцём, як напрыклад, ганучы, бітае шкло, косьці, коркі, акуркі, кавалкі жалеза, непатрэбная папера, кавалкі вяровак, скуры і шмат інш.—ўсё гэта каштоўна і пры арганізацыі, можа даць нам досіць вялікі прыбытак.

Звяртаем увагу на косьці, якіе валяюцца у нас усюды і якіе на нашых вачох збіраюцца з тым, каб прадаваць у цэнтральныя склады.

Мы павінны самі збіраць косьці, каб быць гаспадаром свайго багацьця.

Маскоўшчына вядзе гандаль касьціма ўжо 100 гадоў. Да ўсясьветнай вайны ў Маскоўшчыне 43 фабрыкі перараблялі косьці, на Польшчы, Літве і Беларусі—18 фабрыкаў, у Фінляндыі — 11 фабрыкаў. Усяго перараблялося 4 мільёны пудоў касьцей.

З касьцей вырабляюць: лой, клей, штучныя гнаі, касьцяную муку, касьцяное марло і вугаль.

Клей касьцяны ужываецца на склейку дрэва, пры вырабе капялюшоў, у друкарні і т. д.

Касьцяная мука самы лепшы харч для дамовых птушак і жывёлы. Касьцяны вугаль ужываецца пры вырабе цукру.

З усяго вышэй гаворанага відаць, якая карысьць ёсьць ад касьцей.

Асабліва пасля вайны ўсюды на ўсёй Беларусі ёсьць шмат касьцей, кожная вёска, кожны засьценак павінны арганізавацца (пры дапамозе коопэратываў), каб мець цэнтральны склад, куды ўсе павінны зносіць косьці, каб скарыстаць іх.

Мы ахвотна з свайго боку дапаможам радаі, куды і каму іх прадаць.

Інжынер Раманоўскі.

Беларускі Цэнтральны Саюз Сельскай Гаспадаркі.

Весткі Сельска-Гаспадарскай Коопэрацыі і Сельска-Гаспадарскай Кронікі.

Ад Беларускага Цэнтральнага Саюзу Сельскай Гаспадаркі.

Парадак закладу с.-гаспадарскага таварыства такі: 4 экз. статуту трэба падпісаць ня менш 7 асобам, запоўніць заяву і ўпаважніць адну асобу вясці справу аб зацверджанні статуту. Подпісы і праваздольнасць гэтых асоб павінны быць пасведчаны гмінаю, ці раённым начальнікам. Тады заяву з статутам і 150 мк. на рэгістрацыю перасылаеце павятоваму старасце, які павінен даць Вам адказ на заяву ў працягу 3 тыдняў, у праціўным выпадку, не адтрымліваючы ніякага адказу ад улады, новае Т-ва, згодна існуючых на ўсходных землях законаў, мае права пачынаць працу.

Адначасна з падачаю на зацверджанне статуту робіце сход для зацікаўленых гаспадароў, напішаце пратакол аб ўваходзе закладаемага Т-ва ў сябры нашага Саюзу, ўносіце паі і частку пая, а зьясьне 25 мк. з кожнага сябра Т-ва адлічаеце ў Саюз, згодна нашаму статуту, а так сама ўносіце 50 мк. уступнай платы з усяго Т-ва.

Выпіску з гэтага пратаколу (прыкладаецца блянак) з цяямі і ўступнаю платою (глаўным чынам павінна быць ўнесена ўступная плата 50 мк.) перасылаеце ў Беларускі Цэнтральны Саюз Сельскай Гаспадаркі, па адрэсе: Менск, Аляксандраўская вул., д. Кантаровіча ў падворку.

Пасьля гэтых фармальнасцяў новае Т-во можа завязваць ўсялякіе дзелавыя адносіны з Саюзам: збіраць авансы на машыны, даваць заказы, прасіць інструктароў для арганізацыі якога-небудзь дзела, напрыклад, арцеляў на пераробцы і збыту малочных прадуктаў, прадуктаў саду, агароду і інш.

Статуты і блянкі заяваў можна выпісаць ад Саюзу за 10 марак комплект.

У апошніе часы закладаюцца Сел.-Гаспад. т-вы і ўжо заложаны: „Малкаўскае Сел.-Гасп. Т-во“ у Бабруйскім павеце, Ляскавіцкай гміны, „Глускае Сел.-Гасп. Т-во“ Бабруйскага павету, Глускай гміны, „Заслаўскае Сел.-Гасп. Т-во“ у Заслаўі, Менскага павету; апроча гэтага прыступлена да арганізацыі Бабруйскага Т-ва сялянскіх гаспадароў.

Пры Саюзе ёсць гандлевы аддзел, адчынена крама, у якой выходзяць розныя сел-гасп, рэчы, якія будуць прадавацца сябром, коопэратывам, і таварыствам у першай чарзе і за танейшыя цэны, а аддзельным гаспадаром за нормальныя цэны. У сучасны момэнт у краме ёсць: гвоздзі, лапаты, вілы, жалезо новае і старое, падковы, акуцьця для вазоў, жалезо на бароны, каменны вугаль для кузняў і інш.

Адрэс крамы: Траецкая вул., № 36, ўход з Старажоўскай.

Праца паміж Урадам Беларускага Цэнтральнага Саюзу Сельскай Гаспадаркі разьдзелена у гэтым парадку: Аграном п. Б. Тарэшчанка — старшыня, тэхнічным аддзелам кіруе інжынер п. А. Трэпка, агранамічным аддзелам кіруе п. А. Бонч-Асмалоўскі і аграном п. Сыпанура, аддзелам сел.-гасп. складаў п. В. Кернажыцкі і пракатным пунктам п. А. Шатэрнік.

Ад Саюзу ў Варшаве арганізавана прадстаўніцтва, на чале якога стаіць інжынер п. Дубайкоўскі.



Рэдактар: А. ЎЛАСАЎ.

Выдавец: Беларускі Цэнтральны Саюз
Сельскай Гаспадаркі.

Беларускі Цэнтральны Саюз Сельскай Гаспадаркі
гэтым прапануе ўсім беларусам
спэцыялістам сельскай гаспадаркі
(аграномам, спецыялістам, інструктаром і тэхнікам)
рэгістравацца ў канцылярыі Саюзу.
Менск, Аляксандраўская вул. 36.

Беларускі Цэнтральны Саюз Сельскай Гаспадаркі
гэтым апавяшчае, што пры Саюзе
адчыніно Консультацыйнае Бюро.
Мэта яго — даваць рады на пытаньні аб сельскай
гаспадарцы і арганізацыі сельска-гаспадар-
скіх таварыстваў на мясцох.
Адрэс: Менск, Аляксандраўская вул. 36.

Абвэстка Б. Ц. С. С. Г.

Сельска-Гаспадарскія таварыствы і спажывецкія сялянскія
коопэратывы могуць выпісаць ад Саюзу
насенне цукровых буракоу.



Хачу купіць рой пчаліны.
Земцаў, якіе могуць прадаць раі, прашу завядоміць
ў Рэдакцыю „САХІ“.

ПЕРШАЯ РАСІЙСКАЯ ХЛЕБАПЯКАРНЯ

С. МІГУЦКАГА і С-кі, быўп. ШТАКЕЛЯ.

Менск, Нова-Маскоўскі завул., д. Залкінда, наўпроці № 4.

Прымае заказы, паграды ад вайсковых аддзелаў урадаў,
коопэратываў на **ВЫПЕЧКУ ХЛЕБА і БУЛАК.**

На месцы і драбязговая прадажа хлеба.

Цэны і гатункі хлеба вонках конкурэнцыі.

Лябораторыя воспы вэт. лекара І. СЕРАДЫ

у Менску (Стаенная 7, рог 3-га Шпітальнага завул.)
вырабляе ў уласным воспавым цялятніку
воспавы дэтрыт (Wassuna—Limfa)
і прадаець яго ў ампулах па 10, 25, 50 і 100 дозау.
3 правінцыі радзіцца прысылаць за дэтрытам.



Тэхнічнае Бюро і склад тэхнічнага начэньня Ю. ЯКУБОУСКАГА.

Менск. Сярпухоўская, 19.

Будоўля і абсталюнкi млыноў, лесапiлак і iнш. фаб.
Электротэхнічныя устаноўкi. Рэмонт машын. Пара-
выя і газавыя лёкомобiлi, станкi. Абсталюнкi эксплэ-
атацыі тарфянікаў на апал.

Уладжаньне вузкакалейных чыгунак.

Бюро адчынена ад 9 да 4 гадзiны.



Р У Н Ь

31-га мая г. г. ў Менску выходзіць но-
вая часопісь.

- Рунь** беларускае літэратуры і мастацтва.
- Рунь** у ліку сваіх супрацоўнікаў мае самыя найважнейшыя літэратурныя і мастацкія сілы.
- Рунь** захоўвае сваім зьместам беларускае пісьменство, поэзію, гісторыю, памяткі мінуўшчыны, крытыку і г. д.
- Рунь** служыць вялікім ідэалам красы і свабоды.
- Рунь** выходзіць ня меней 4-х разоў у месяц.
- Рунь** каштуе з перасылкай толькі 5 марак за адзін нумар, на 1 м-ц—20 мар., на 3 мес.—60 мар.
- Рунь** выходзіць пад рэдакцыяй Янкі Луцэвіча, выдавец проф. Вацлаў Іваноўскі.

Адрэс: Рэдакцыя—Менск, Кашарская 10, кв. 5, (адчынена ад 10 да 11 г. зраньня).
Адміністрацыя: вул. Міцкевіча, Беларускі Дом (адчынена ад 9 да 3 г. дня).

P.1307
3118
/1920



У КНІГАРНІ
БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЬНАЙ РАДЫ
прадаюцца
кніжкі і газэты,
вул. Міцкевіча (Захараўская), б. Юбіл. дом.



№. тв. 156