

# ВИЛЕНСКІЯ

## ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 12.

СУББОТА, МАРТА 21-го ДНЯ 1853 ГОДА.

### ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ: О кончинѣ Прелата Микуцкаго.— О разстройствѣ желудка (несвареніи пищи), причинахъ и припадкахъ этой болѣзни и средствахъ къ ея излеченію.

#### О КОНЧИНѢ ПРЕЛАТА МИКУЦКАГО.

1-го числа текущаго Марта мѣсяца, скончался здѣсь Ксендзъ *Викентій Корвизъ Микуцкій*, Несторъ Виленскаго Капитула, Прелатъ-Архидіаконъ Каѳедры, Докторъ Богословія, Кавалеръ Ордена Св. Анны 2-й степени, на 91 году отъ роду. Родившись въ Россіенскомъ Уѣздѣ въ 1762 году, въ юныхъ лѣтахъ вступилъ онъ въ духовное званіе, и по окончаніи курса высшихъ наукъ въ Семинаріи и въ тогдашнемъ Главномъ Литовскомъ Училищѣ, посвященъ былъ во Священники въ 1785 году; затѣмъ исправляя одну за другою разныя должности въ тогдашнемъ Надворномъ Епископскомъ Судѣ, Капитулѣ и Консистоіи, въ 1825 году назначенъ былъ Прелатомъ Кустошомъ Виленской Каѳедры, а въ слѣдующемъ 1826 году, по смерти Преосвященнаго Митрополита Сестрженцевича, былъ избранъ Капитуломъ въ Администраторы Виленской Епархіи, и Высочайше утвержденъ въ этой должности, которую исполнялъ по 6 Маія 1828 года, то есть до вступленія на Епископскую Каѳедру Преосвященнаго Андрея Клонгевича.

Награжденный впослѣдствіи, за оказанныя за слуги, званіемъ Прелата Архидіакона и орденомъ Св. Анны 2-й степени, остальное время благочестивой и богобоязненной жизни посвятилъ усердному исполненію обязанностей своего званія, сохраняя до послѣдней почти минуты удивительную крѣпость тѣла и ума, отличаясь непоколебимымъ спокойствіемъ духа и привлекательною добротою сердца, коими снискала общее почтеніе и любовь. При погребеніи, происходившемъ 5-го Марта, въ Церкви Св. Іоанна, богослуженіе совершалъ Виленскій Епископъ, Преосвященный *Жилинскій*, а многочисленное собраніе лицъ обоего пола и всѣхъ состояній, воздало послѣдній долгъ заслугамъ и памяти достойнаго почившаго.

#### О РАЗСТРОЙСТВѢ ЖЕЛУДКА (НЕВАРЕНІИ ПИЩИ), ПРИЧИНАХЪ И ПРИПАДКАХЪ ЭТОЙ БОЛѢЗНИ И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕЯ ИЗЛЕЧЕНІЮ.

Разстройствомъ желудка называютъ временное нарушеніе процесса пищеваренія. Раз-

стройство желудка не есть болѣзнь въ строгомъ смыслѣ слова, но одинъ изъ быстро появляющихся припадковъ, которые обыкновенно нарушаютъ здоровьѣ только временно, но которые могутъ, однакожь, подвергнуть жизнь человѣка опасности, или оставить послѣ себя глубокіе слѣды. Въмѣстѣ съ тѣмъ, разстройство желудка есть одинъ изъ обыкновеннѣйшихъ случаевъ, въ которомъ можно помочь скоро и прежде, чѣмъ придетъ врачъ. По этому всякому полезно знать все степени и явленія разстройства желудка и быть въ состояніи оказать пособіе человѣку, который подвергнулся этому недугу.

Разстройство желудка происходитъ иногда отъ пищи, а иногда совершенно отъ другихъ причинъ. Къ числу веществъ, производящихъ разстройство желудка, должно прежде всего отнести сырыя, жирныя и маслянистыя вещества, которыя преимущественно называются неудобоваримыми. Нельзя однакожь указать на постоянныя правила въ этомъ отношеніи, ибо несвареніе пищи есть понятіе относительное: у инаго человѣка желудокъ перевариваетъ очень хорошо вещества, признаваемые неудобоваримыми, и тотъ же человѣкъ можетъ страдать разстройствомъ желудка отъ употребленія въ пищу вещества, извѣстнаго своею удобоваримостью; по этому всякій человѣкъ въ выборѣ пищи долженъ руководствоваться собственнымъ опытомъ. Температура пищи бываетъ иногда прямою причиною разстройства желудка; таково дѣйствіе очень холодныхъ кушаньевъ, и питья со льдомъ. Что касается до кушаньевъ очень теплыхъ—горячихъ, то трудно сказать, чтобы они имѣли тоже свойство, ибо органъ вкуса, будучи гораздо чувствительнѣе къ жару, чѣмъ самый желудокъ, отталкиваетъ пищу слишкомъ горячую.

Если качество веществъ, употребляемыхъ въ пищу, бываетъ часто причиною разстройства желудка, то тоже самое должно сказать о количествѣ. Извѣстно, что много есть людей,

которые въ одинъ пріемъ сѣдаютъ такое количество пищи, какое было бы достаточно имъ для прокормленія себя въ теченіе нѣсколькихъ дней; и хотя нѣкоторыя обжоры удивляютъ своею въ томъ отношеніи способностью, но зато они часто дорого за это и оплачиваются. Жидкости, принятыя въ желудокъ въ большомъ количествѣ, производятъ иногда тоже дѣйствіе какъ и вещества твердыя и также могутъ разстроить процессъ пищеваренія.

Кромѣ пищи, многія другія причины могутъ производить разстройство желудка: извѣстнаго рода движеніе, напримѣръ на качеляхъ, въ экипажахъ, качка корабля. Сюда же надобно отнести сильныя движенія передъ или тотчасъ послѣ ѣды. Очень ошибаются многіе, думая что для облегченія пищеваренія необходимо сильное движеніе; напротивъ, пищевареніе лучше совершается когда послѣ ѣды человѣкъ остается въ покоѣ, или ходитъ тихими шагами. Замѣтимъ мимоходомъ, какъ часто случается встрѣчать людей совершенно незнакомыхъ съ самыми простыми правилами гигиены; многіе, при всемъ образованіи, не знаютъ должно ли ходить или сидѣть на мѣстѣ, чтобы облегчить пищевареніе.

Быстрое дѣйствіе холода въ то время, когда начинается совершаться пищевареніе, разстроиваетъ часто дѣятельность желудка; этия объясняется почему, при началѣ осеннихъ холодовъ, встрѣчается много людей, жалующихся на разстройство желудка: дѣло въ томъ, что они тотчасъ послѣ обѣда выходятъ на воздухъ, который сдѣлался уже холоднымъ.

Сильныя душевныя потрясенія, глубокая печаль и нечаянная радость, гнѣвъ, нервныя припадки, если они случаются съ человекомъ тотчасъ послѣ ѣды, могутъ быть причиною разстройства желудка. Если эти обстоятельства случатся предъ началомъ ѣды, то они также могутъ произвести дурное послѣдствіе; по этому благоразуміе требуетъ садиться за столъ не прежде какъ по прошествіи душевнаго волненія. Сидячая умственная работа, послѣ ѣды,

можетъ причинить сильное разстройство желудка. Видь какихъ либо отвратительныхъ вещей, нѣкоторые очень сильные запахи способны произвести тоже болѣзненное состояніе. Наконецъ множество болѣзней пищеварительныхъ органовъ служатъ важнымъ препятствіемъ къ совершенію пищеваренія.

Признаки или припадки разстройства желудка суть слѣдующія: неловкость, чувство тяжести и полноты въ желудкѣ, за тѣмъ слѣдуетъ икота, кислая или зловонная отрыжка и чувство тошноты; пища производитъ родъ отвращенія, а съѣденныя кушанья неприятно вспоминаются. Несмотря на отвращеніе, возбуждаемое рвотою, больной начинаетъ считать ее скорѣе за облегчительное средство, и многіе, чтобъ произвести ее, нарочно кладутъ какъ можно далѣе пальцы въ горло.

Въ то же время начинается дрожь, иногда холодный потъ, лице блѣднѣетъ, появляется слабость, которая можетъ причинить даже обморокъ; во рту чувствуется сухость и клейкость, начинается сильная головная боль и нерѣдко дѣлается приливъ крови къ головѣ.

Всѣ эти припадки могутъ постепенно уменьшаться и пищевареніе возстановляется; но когда они очень упорны, то исходъ бываетъ очень дурной: появляются урчаніе въ животѣ, сильная рвота, которая обыкновенно облегчаетъ больного. Рѣдко случается, чтобъ пища не начала уже перевариваться, но пищевареніе вдругъ останавливается, и часто случается, что извергнутыя вещества вовсе неизмѣнились хотя они были приняты желудкомъ часовъ 6 или 8 передъ тѣмъ. Испражнения низомъ если случаются не вмѣстѣ со рвотою, то появляются скорѣе за нею и обыкновенно они служатъ признаками окончанія болѣзненного состоянія.

Какое же леченіе слѣдуетъ предложить противъ разстройства желудка?

Если обратить вниманіе на ходъ этого болѣзненного состоянія, то легко указать леченіе, которое слѣдуетъ употреблять при этомъ.

Если припадки не очень сильны, если больной чувствуетъ только тяжесть и полноту въ желудкѣ безъ позыва на рвоту, то можно надѣяться, что пищевареніе само собою совершится, въ особенности если ему помочь; въ этихъ то случаяхъ настой обыкновеннаго чая можетъ быть очень полезенъ. При недостаткѣ чая, и даже предпочитаютъ употреблять такимъ же образомъ, т. е. теплымъ настоемъ липоваго цвѣта, померанцовыхъ цвѣтковъ, ромашки, богородицкой травы, вероники и мелиссы.

Многіе употребляютъ кофе или спиртные напитки; но эти средства хороши въ нѣкоторыхъ только рѣдкихъ случаяхъ, когда желудокъ постоянно подверженъ слабости; при всѣхъ другихъ обстоятельствахъ этимъ средствомъ можно лишь увеличить раздраженіе и причинить дурныя послѣдствія; слѣдовательно этотъ способъ леченія требуетъ большой осторожности и положительнаго знанія темперамента больного. Сахарную воду съ прибавкою померанцовой или мелисовой воды можно давать безъ опасенія.

Вотъ лекарство, которое часто помогаетъ и которое надобно принимать по чайной ложкѣ каждыя десять минутъ; если больного не тошнить, то рѣдко случается, чтобы нѣсколько ложекъ его, при употребленіи одного изъ упомянутыхъ ароматическихъ веществъ, не возстановили бы пищеваренія:

Возьмите: настоя липоваго цвѣта	19	золот.
сиропу изъ померанц. корки	8	
гофманскихъ капель	3	
корицевои воды	2	
мятнои воды	2	

Наконецъ въ тѣхъ случаяхъ, когда рвота неминуемо должна послѣдовать, надобно стараться скорѣе ее произвести; потеря времени можетъ только продолжить страданія больного и повредить успѣху леченія. Теплая вода, даваемая по стакану чрезъ нѣсколько минутъ, или щекотаніе язычка въ горлѣ перомъ или пальцами, обыкновенно бывають для того достаточны. Если бы это не помогло, то можно упо-

требить ипекакуану или рвотный камень, но инаиначе какъ по совѣту врача. Когда появляется рвота, то не слѣдуетъ никогда давать пить холодную воду, ибо она напротивъ останавливается ея. Но когда можно полагать, что вся пища извергнута вонъ, а желудокъ, подъ вліяніемъ нервнаго раздраженія продолжаетъ корчить, то часто можно прекратить эту безполезную рвоту, давая больному пить, небольшими глотками сахарную воду, къ которой прибавлять нѣсколько капель лимоннаго сока.

Можетъ случиться, что въ продолженіе растройства желудка дѣлается столь сильный приливъ крови къ головѣ, что необходимо пустить больному изъ руки кровь. Но въ такомъ случаѣ надобно прибѣгнуть къ совѣту врача. Прежде же всего слѣдуетъ облегчить желудокъ, ибо часто приливъ крови къ головѣ проходитъ тотчасъ послѣ рвоты, не требуя кровопусканія.

Когда всѣ припадки растройства желудка исчезнутъ, то слѣдуетъ дать ему отдохнуть; діета почти всегда необходима въ продолженіи часовъ двѣнадцати; за тѣмъ давать больному какую нибудь легкую пищу: какъ напр. бульоны. Питье, нѣсколько возбуждающее, какъ напримѣръ настой чая, липоваго цвѣта или мелиссы, очень полезенъ, а также смягчительные клистиры изъ отрубей, проскурняка или льнянаго сѣмени. Но иногда растройство желудка оставляетъ послѣ себя глубокіе слѣды. Въ особенности, когда оно случается у людей уже нездоровыхъ, то можетъ потребовать особаго леченія. Воспаленіе желудка или нервнаго пораженія его происходятъ всего чаще отъ одного или нѣсколькихъ растройствъ этого органа; ихъ можно избѣгнуть съ большою вѣроятностію уходомъ за больными во время растройства. (Зем. Газ.)